

### 衛生故事

阿火結婚已經三年，但還沒有孩子，妻子阿嬌也非常着急，但是經過新來的隣居張先生介紹他們去拜訪了鎮上的洪醫生後，不久阿嬌就有了喜，這真使他們欣喜欲狂。

時間很快地過去，阿嬌已到產期；在助產士的協助下，很順利地產下一個白白胖胖的小男孩，阿火喜得手足無措，把全付精神都寄托在小孩身上，在田裏工作時，常常不自覺地停止了工作優笑，一回了家，立刻把孩子抱起來，問他吃了幾次奶了？換了尿布沒有？哭了，是不是熱了？還是冷了？阿嬌也是成天抱了孩子，幾乎忘了自己是剛生產後的人了。

## 產後養護要注意

怡·怡·

點瀉藥如吃後仍不見效，那就要請醫生灌腸或另外用藥了。」

阿火聽得出神，至此插嘴問道：「還有呢？」

「產婦的衣服最好要寬大而清潔，因為產婦皮膚分泌物特多，所以應常更換衣服及床單，其他如室內空氣及陽光也要流通充足，惟應注意不能吹風以免感冒。」洪醫師說完以後，再三叮囑阿火對妻要格外當心，阿火這才明白產後之養護是如此地重要，連聲多謝，送走了洪醫師。

困難，不妨多給飲料，或用手在膀胱上輕壓。生產以後二日，就應該大便，如無法自便，且無特殊情形，不妨使她吃

可是三天後阿嬌發熱了，熱得支撐不起來，阿火這才覺得事情不妙，於是慌慌張張的去找洪醫生。經他診斷明白，是產後失調，產道內創傷未愈，被細菌侵入而發生產褥熱，「這種病在以前是很危險的，現在有了各種特效藥，能及早醫治，是沒有多大關係了」。洪醫生爲了要使阿火明白對產婦應有的衛生常識，就不厭其詳的繼續告訴阿火說：「婦女的生產是一件應特別注意的事情，如調養不週，就很容易染病或竟喪失生命，所以應該注意產婦



## 曲長業 信相

播種。  
自播種後早生種  
九十天，中生一百天，  
晚生一二〇天收穫。  
收量每分地三百萬  
斤左右（稻谷）。

### 種植陸稻的問題

問：請教陸稻之種子向何處採購得到，種植法如何，北部種植適期何時，需多少天可以收穫，產量如何？（桃園縣大溪鎮吳學壽）

答：陸稻種子近年來因旱害，數量很少，請向「南投縣名間鄉農會」接洽。  
土壤只要不是過度的砂與粘質都適宜，富於腐植質的壤土最好。  
北部六月中旬播種；桃園縣五月中旬可

### 油菜怎樣採種？

問：①油菜在平地是否可以採種？  
②採種後幾天可以採到種子？

採種。  
自播種後早生種  
九十天，中生一百天，  
晚生一二〇天收穫。  
收量每分地三百萬  
斤左右（稻谷）。

耕作要項：甲當  
播種量一百萬斤，耕地後撒施土糞三萬至四萬萬斤，再翻犁刈碎土塊，以手耙整平，條寬一·五尺至二·〇尺，用犁頭做播條；條散播後覆土約五分至一寸左右，待八寸高時施追肥，（硫酸一〇〇至一五〇萬斤，過磷酸鈣一百萬斤，鉀肥五〇萬斤）兼行中耕除草二—三次。（臺中區農林改良場余慶東）

子？  
③種子要晒乾還是風乾？要怎樣保藏種子？  
④油菜是否周年可以栽培？（臺南市林秋霖）

答：①本省油菜現有二種：一種是中部盛行栽培的專採種子榨油的油菜，日本名萊種；還有一種是前三年由省外傳入高雄再傳播全省專門作蔬菜用的油菜。前者葉色黃綠；後者葉色亮油青綠，所以叫做油菜或叫油冬菜。這裡所指的就是後一種。油菜在本省採種容易。

②油菜播種後一個月抽苔；再經七八十天種子成熟就可以採收。

③油菜大部份種子在種夾內成熟時，就可以把全株割下，最好倒掛在風乾室後熟，風乾後脫粒篩選乾淨後稍行曬乾，再待放冷後收藏。保藏種子的方法可參照本刊五卷入期十一頁甜椒及菜豆種子貯藏法。

### 菜豆銹病如何防治？

問：敏豆，近日葉面呈現出微細的赤斑點，日漸擴大，傳播甚速，終而，變成枯乾葉。此狀稱爲何病？有無預防法？有無藥劑可治，使用那種較適當？（高雄縣路竹鄉高大抱）

答：這是菜豆（敏豆）銹病，發病的原因是由於一種病菌所侵害的。病葉上鐵銹色的粉末，就是無數的病菌，病菌由風力傳播，此外它也可以附著在田間工作者的衣服、農具或交架的竹竿上。

撒佈硫黃粉未能有效預防此病，不過所用的硫黃粉粒要細的，粉粒愈細，效果愈好。西藥店所買的硫黃粉都不够細，使用以前