

衛生故事

阿火結婚已經三年，但還沒有孩子，妻子阿嬌也非常着急，但是經過新來的隣居張先生介紹他們去拜訪了鎮上的洪醫生後，不久阿嬌就有了喜，這真使他們欣喜欲狂。

時間很快地過去，阿嬌已到產期；在助產士的協助下，很順利地產下一個白白胖胖的小男孩，阿火喜得手足無措，把全付精神都寄托在小孩身上，在田裏工作時，常常不自覺地停止了工作優笑，一回了家，立刻把孩子抱起來，問他吃了幾次奶了？換了尿片沒有？哭了，是不是熱了？還是冷了？阿嬌也是成天抱了孩子，幾乎忘了自己是剛生產後的人了。

產後養護要注意

怡·怡·

點瀉藥如吃後仍不見效，那就要請醫生灌腸或另外用藥了。」

阿火聽得出神，至此插嘴問道：「還有呢？」

「產婦的衣服最好要寬大而清潔，因為產婦皮膚分泌物特多，所以應常更換衣服及床單，其他如室內空氣及陽光也要流通充足，惟應注意不能吹風以免感冒。」洪醫師說完以後，再三叮囑阿火對妻要格外當心，阿火這才明白產後之養護是如此地重要，連聲多謝，送走了洪醫師。

困難，不妨多給飲料，或用手在膀胱上輕壓。生產以後二日，就應該大便，如無法自便，且無特殊情形，不妨使她吃

可是三天後阿嬌發熱了，熱得支撐不起來，阿火這才覺得事情不妙，於是慌慌張張的去找洪醫生。經他診斷明白，是產後失調，產道內創傷未愈，被細菌侵入而發生產褥熱，「這種病在以前是很危險的，現在有了各種特效藥，能及早醫治，是沒有多大關係了」。洪醫生爲了要使阿火明白對產婦應有的衛生常識，就不厭其詳的繼續告訴阿火說：「婦女的生產是一件應特別注意的事情，如調養不週，就很容易染病或竟喪失生命，所以應該注意產婦



曲辰業 信相

播種。
自播種後早生種
九十天，中生一百天，
晚生一二〇天收穫。
收量每分地三百萬斤左右（稻谷）。

種植陸稻的問題

問：請教陸稻之種子向何處採購得到，種植法如何，北部種植適期何時，需多少天可以收穫，產量如何？（桃園縣大溪鎮吳學壽）

答：陸稻種子近年來因旱害，數量很少，請向「南投縣名間鄉農會」接洽。

土壤只要不是過度的砂與粘質都適宜，富於腐植質的壤土最好。
北部六月中旬播種；桃園縣五月中旬可

油菜怎樣採種？

問：①油菜在平地是否可以採種？
②採種後幾天可以採到種子？

子？
③種子要晒乾還是風乾？要怎樣保藏種子？
④油菜是否周年可以栽培？（臺南市民秋霖）

答：①本省油菜現有二種：一種是中部盛行栽培的專採種子榨油的油菜，日本名菜種；還有一種是前三年由省外傳入高雄再傳播全省專門作蔬菜用的油菜。前者葉色黃綠；後者葉色亮油青綠，所以叫做油菜或叫油冬菜。這裡所指的就是後一種。油菜在本省採種容易。

②油菜播種後一個月抽苔；再經七八十天種子成熟就可以採收。
③油菜大部份種子在種夾內成熟時，就可以把全株割下，最好倒掛在風乾室後熟，風乾後脫粒篩選乾淨後稍行曬乾，再待放冷後收藏。保藏種子的方法可參照本刊五卷入期十一頁甜椒及菜豆種子貯藏法。

菜豆銹病如何防治？

問：敏豆，近日葉面呈現出微細的赤斑點，日漸擴大，傳播甚速，終而，變成枯乾葉。此狀稱爲何病？有無預防法？有無藥劑可治，使用那種較適當？（高雄縣路竹鄉高大抱）

答：這是菜豆（敏豆）銹病，發病的原因是由於一種病菌所侵害的。病葉上鐵銹色的粉末，就是無數的病菌，病菌由風力傳播，此外它也可以附著在田間工作者的衣服、農具或交架的竹竿上。

撒佈硫黃粉未能有效預防此病，不過所用的硫黃粉粒要細的，粉粒愈細，效果愈好。西藥店所買的硫黃粉都不够細，使用以前

應把確黃粉放在石臼或乳鉢中再加研磨，用微粉器撒佈。撒粉時期應在病害剛開始發生時收效較大，豆粒既已發病，也可以使用，以防止此病擴大蔓延。(省農業試驗所洪章訓)

柑橘切接的接穗與芽的問題

問：我看了農年第五卷第一期七頁所說的柑橘的切接法，有下面兩個疑問：①請問為甚麼接穗以春天所剪的枝條為佳，夏秋的不宜採用。②一枝接穗上端的幾個芽和基部的幾個芽都不宜採用，(由中部一段為最好的接穗，這是為什麼？(苗栗縣造橋鄉張仁生)

答：①柑橘的春梢或夏秋梢上所發的芽只要發育充實及韌皮部厚者，均可用。②從接穗中間部取芽最佳，因其發育充實。(國立臺灣大學園藝系胡呂攝)

葡萄的鐵金龜

問：我種葡萄，枝葉甚為繁茂，不料夏初，忽有一種害蟲，名叫「鐵金龜」，深灰色，如蒼蠅大小，每晚天黑後，成群飛來，不到一星期，葉子被吃去大半，發覺後，每晚捕捉，捕殺千餘隻以後，現在蟲很少了。因怕明年再發生這種害蟲，請指教有什麼特效藥可防治嗎？(臺中縣豐原鎮馮雲山)

答：本省土名所謂「鐵金龜」就是一種金龜子，此蟲通常是夜出性為害的，在我國福建省為害甚烈。防治法：以噴佈地特靈劑五百倍液或愛特靈劑入百倍液最為有效，如當地買不到這兩種藥劑時，可噴佈一〇〇DDT粉劑，或一〇BHC粉劑，或噴佈二五〇DDT二百倍，或七五〇DDT可濕性粉劑三百倍液。

利用此蟲夜出為害的習性，於夜間持電筒或其他燈火圍中巡視，如有發現可用手捕殺，此法經濟而有效。(省農業試驗所陳履通)

茭白抽穗減少收量

問：茭白抽穗不生筍，這是什麼原因，有何改善方法？(臺北縣金山鄉農會李欽賢) 答：我們所說的茭白筍，實在是在有一種名叫「烏龜」的病菌侵入茭白莖部，莖梢部受刺激而膨大形成病筍，因此莖梢生長被抑制不能抽穗，如果茭白的抗病力強大，或沒有烏龜病菌寄生時，莖部就不會膨大，頂芽繼續生長成莖軸，終至抽穗開花，這時就沒有筍部，只有稍為肥大的莖軸可收，收量就大減。普通野生茭白不易被烏龜菌寄生，所以應選容易被烏龜菌侵入的品種或系統栽種。(郁宗雄)

檸檬桉與大葉桉比較

問：檸檬桉與大葉桉品質是否相同，木材用途有何差別？ ①種子何處有賣，價格若干？ ②檸檬桉與大葉桉育苗方法有無差別？ (苗栗縣三灣鄉黃雙興)

答：①檸檬桉之材質與大葉桉相似，均緻密而沉重，但材淡色不像大葉桉材為紅色。木材用途也相若，可充堤工、橋工、海底工及鐵道枕木之用；而且葉片中含油量達一五至五，蒸餾而得桉葉油，供醫藥用，但大葉桉則無此用途。 ②檸檬桉種子請向南投蓮華池省林業試驗所蓮華池分所洽採，或向花房園藝場(臺北市迪化街二段三〇巷五號)函購，一公升價一千二百元。 ③檸檬桉苗木移植非常困難，不易成活，所以多用竹筒育苗或直播造林，請詳看豐年四卷四期七頁桉樹類苗木育苗造林法。大葉桉育苗造林均易成活，所以用植樹造林法，管理粗放。(甘偉松)

桑樹剪定型的優劣點

問：我種有低刈桑、中刈桑、高刈桑，和喬木桑四種桑樹，這四種型式以後的收量有沒有差別？其他還有什麼不同的優劣？(花蓮縣吉安鄉關萬居)

答：在同一環境情形下，其栽植後數年間的收量，根刈桑最多，中刈桑次之，高刈桑最少。此後就都隨年數增加產量。到十五年後，根刈桑就逐漸減少，高刈桑仍能產不衰，而喬木桑一棵有能得四五十公斤收量的。

至於各式剪定的其他優劣點如後：
根刈桑適於種在東南向溫暖的地位。優點為：①發育快，收穫早，葉質柔軟；②摘葉剪枝和整枝等作業便利；③病蟲害少，防治也容易；④表土淺和地下水高的地位，也能栽植。缺點為：①剪伐較多，樹勢易衰，樹齡較短；②萎縮病容易發生，下部葉片，容易沾染泥土；③耕除草和施肥等工作較難；④容易遭旱害和霜雪寒凍等害。
高刈桑在西北向寒冷的地位也能栽植。優點為：①桑園內可行間作，土地能充分利用，葉質成熟早；②霜雪寒凍等害和水旱災害較輕；③萎縮病少，下部葉片也比較清潔；④剪伐較少，樹齡可維持長久；⑤路旁堤岸，瘠地澤地，都可以栽植。缺點為：①摘葉剪枝和整枝等作業不便；②容易遭病蟲害損失，嚴重的話，幾年之間都荒廢無用；③根須深植，表土淺的不能利用；④樹勢養成需時較長，不能急於收穫。

中刈桑的優劣點是介乎根刈與高刈之間。喬木桑的優劣點與高刈桑相似。(中央農業研究所管琛)

(按：其他有關養桑問題可參看本刊六卷十四期二十八頁和六卷二十四期二十四頁。)

讀者服務

△徵求純本地種(美濃種、双溪種、桃園種)小母豬數頭，請開明每頭重量及每斤價格。臺南縣麻豆鎮坪子尾二二號，林來清。
△徵購兼用種純種大型澳洲黑及肉用種不老母雞初生雞無白痢傳染者各十隻。雲林縣褒忠鄉馬鳴村六塊路二十號張顯榮。
△徵求純種檳榔苗(青仔)及杉苗數株。請函南投縣中寮鄉龍岩村胡大明。
按：本欄篇幅有限，服務對象限本刊現在訂戶。

春季蔬菜種子 (正由日本、美國輸入種)

- △夏トマト用交配種子 福壽二號、晚化二號トマト、世界一トマト
- △正抽型トマト、ブリチヤード、マグローブ
- △長大節成胡瓜
- △臺灣四季用交配種：久留米五三〇號胡瓜
- △落合胡瓜(花別瓜兼用) △結球チシャ、莖チシャ
- △砂村太葱、丸葱太葱
- △大和二號、三號西瓜、嘉寶西瓜
- △干成黃瓜、ニユメロン
- △ロツキト用洋葱種子 △食用縮縮南瓜
- △セト用洋葱種子 △食用縮縮南瓜
- 其他各種春季蔬菜種子具備
- △春季各種花種子、大輪朝顏外六十餘種及球根等
- △最新特效農藥
- ①害蟲用マイアヂン、マラソン、パラチオン乳劑
- ②殺菌用DDT、BHC乳劑特製除菌菊乳劑滅菌乳劑
- ③病害用、セレン石灰、ルベロン石灰、ルベロン乳劑
- ④日本石原會社原裝植物補爾藥 トロント、フルトン、トランスプラントン、トマトリン、24D除菌劑
- ⑤殺鼠劑、家庭用デスマス、野鼠用フラトール
- ⑥夏季草店(中庭シメジ)種菌子約開始
- △栽培法及子約辦法附郵票一元函索即寄。

輸入元 臺灣農產企業公司 直賣部 臺灣農業資材公司

董事長 農學士 廖學義 電話：四四二五三、四二三六五