


病膚皮由育發猪仔響影

癬疥與疹濕



羣立黃

不潔的仔猪，粗放的管理，惡劣的飼料，是誘發仔猪皮膚病的重要原因。

仔猪的皮膚病，多半是由于管理的失宜，或營養不良而引起的。又如給與中毒性及變敗的飼料，或猪蟲的寄生，外界物的刺傷，藥品的刺激等等，都是引起皮膚病的原因。所謂皮膚病，如紅斑，濕疹，毒麻疹，膿疱性皮炎（蚊痘瘡），傳染性膿疱性皮炎，疥癬病，毛囊蟲病等都是。不過仔猪通常發生較多的，要算是濕疹，和疥癬病了。

濕疹的發生，是由于飼養管理的不適當及營養不良的結果。普通猪隻的生活環境，大概都是不潔的，猪房若是潮濕，皮膚發生痒覺的刺激而引起炎症，特別是在離乳後的仔猪，因皮膚柔軟脆弱，在無日光、不潔、而潮濕的猪房內，皮膚受到刺激，猪體發痒，便常常靠在

牆壁或飼槽上用力磨擦，以致皮膚上滲出漿液或出血。由于患部的皮膚破裂，因而生活很不安寧，無形中影響其本身的發育，患猪於是漸漸衰弱。

濕疹之早期治療十分重要，因為單靠外用藥物治療，往往不容易得到完全治療之效，所以必須注意營養的增進，管理的周到，猪舍的清潔，以及投入多量乾燥的敷藥；常將猪仔放于舍外運動場上，使牠有較多的日光浴機會。藥物治療，主要的作用除了緩和其痒覺外，也可收到一些治療之效。如用克來奧林（クレオリン）（甘油（グリセリン），酒精（アルコール）混合調製，用布片或毛刷塗到患部三日後痒覺漸減，上皮膚略有剝脫，似有治癒的趨向，第四日用溫肥皂水洗滌全身。再多給營養豐富而容易消化的美味食物，以增進猪隻健康，同時並注意猪房清潔乾燥，大概最多行二次即可痊癒。

最近有一種藥品叫「殺濕疹」（Sulcerin，サルセリン）對濕疹的治療有很大的功效；以〇・五％克來蘇石鹼液（クレゾール石鹼液）洗患部，然後以「殺濕疹」塗擦，一日二至四次，反覆行之即可治癒。此外，又用石灰硫黃合劑，洗滌患部數次，也有效果。

當外用藥品治療的時候，同時在猪房內，必須以石油乳劑充分洗滌，尤其是牆壁等處更為重要。

其次是疥癬病，這是一種很容易與濕疹相

泰山相命張鐵口



一，口鐵張命相（名地）山泰
鐵張信相狗阿，狗阿胡友農個
。走懸懸着叫口鐵，口

伊話講口鐵，錢有真內厝狗阿
命生，死會就久不伊騙，疑無若
（用何有錢）吓卜錢無若

大意假口鐵，口鐵張求哀狗阿
要需）够有者多真銀錢，咿聲多
（道）樓弄甲運補猪剖，（金多
士

火皇文
壬酉圖

農 業 問 答

混的皮膚病，是由於一種疥癬蟲，穿破豬的皮膚，棲息於皮膚內而發生的。在被疥癬蟲寄生部的皮膚，起初發紅，結成小結節，有時形成灰白色的鱗屑，漸漸呈褐色而乾燥，皮膚變肥厚，脫毛，常與他物磨擦而使皮膚發生出血，化膿，瘻爛，潰瘍等現象，患豬於是營養不良，急速衰弱，瘦削而致而死。

此病必須經獸醫的檢查，如確實有疥癬蟲的寄生，可先用錫肥皂與甘油等混合液，軟化皮膚，三小時後洗去，再用那佛脫（ナフトール）、精製硫黃、錫肥皂、凡士林等混和的軟膏，塗布豬體表面約三分之一（不可全身都塗布），四日後洗去，如此反覆二至三次即可收

治療之效。又用五％硫化鉀水溶液，每日全身沐浴一次，反覆使用數次也有功效。在美國是用一％菸鹼（ニコチン），硫化石灰之軟膏塗布，或用四％的石油沐浴，以十日沐浴三次為度，很有效果。

藥物治療時，應同時以三％克來奧林或克來蘇石鹼液，將豬房及器具徹底消毒。

仔豬的皮膚病最好是及早預防，如能注意豬舍的衛生及管理，保持豬隻的清潔及適當的營養，並常使豬隻在日光下曬曬，實行日光浴，那末就可減少得病的機會。更必須牢記：「不潔的豬，粗放的管理，惡劣的飼料，是為皮膚病誘發的重要原因。」

胡蘿蔔可以加工貯藏嗎？

問：①去年十月間購買的胡蘿蔔種子，今年還能用嗎？發芽率怎樣？

③胡蘿蔔已達成熟期，但是還想採收出售，怎樣加工貯藏？（雲林縣斗六鎮魏義勇）

答①胡蘿蔔的種子，普通有二年的發芽力，所以去年的種子，如貯藏妥當（須充分乾燥後，密封貯藏於冷暗乾燥之所），今年秋天還可以利用，發芽率如去年有九〇％，今年約有七五％左右。

②普通胡蘿蔔，自播種至成

熟，約四個月左右。但是如無抽苔，五個月後尚有商品價值。所以，可看市價的情形採收出售。

加工法最簡單者為製乾菜。乾燥方法有真空乾燥和熱氣乾燥（永康食品脫水工廠此法）及日光乾燥等。但前二法需設備，普通農家不能實行。日光乾燥法

是將胡蘿蔔根部洗淨，去皮後切條（細薄片亦可）鋪在淺平的容器內。乾燥時間，如天氣晴朗約五日。乾燥度愈高，貯藏期可愈久。又可將乾燥品炒過磨粉，作為咖啡的代用品供食。其他，還可以製成醬菜貯藏，製法與瓜類的醬菜相同。（陳文郁）

長形和短形胡瓜

問：①長形的胡瓜和短形的胡瓜，那一種較好？

②臺北與農種子行所售的潮洋目瓜，在中部春季可以播種嗎？（臺中縣潭子鄉林秋江）

答：①長形的胡瓜收量，可能比短形胡瓜多，但是因為果形長的關係，蟲害（如瓜實蠅等）可能比短形者嚴重。又採收的果形亦可能比短形者不整齊。普通短形的胡瓜，適於採收小瓜的栽培，長形的胡瓜適於採收大瓜的栽培。

②潮洋目瓜是屬於短日性的品種，在鳳山試作的結果，二月間播種者，開花結果晚，收量不佳，中部亦應在秋季播種較為適宜。春季播種的品種，還是貴地的臺中目瓜最好。至於鳳山試驗所選出的優良品種，因為種子量不多，尚未正式推廣。（陳文郁）



並狗阿，年一（再）閣了過年一④
開（產財）伙家是但，去死來無
遲經已悔反在現，（光化）離離

（子妻）子某，兄狗阿惜可家大④
驚免嚙伊勸友朋，聽嚙勸苦
。命生有死（不）酌定一

嚙攏寶財銀錢，死會伊着想狗阿④
，離離寶宅厝園田，（要不）治
。戲看兼退退飽食