

農 業 問 答

混的皮膚病，是由於一種疥癬蟲，穿破豬的皮膚，棲息于皮膚內而發生的。在被疥癬蟲寄生部的皮膚，起初發紅，結成小結節，有時形成灰白色的鱗屑，漸漸呈褐色而乾燥，皮膚變肥厚，脫毛，常與他物磨擦而使皮膚發生出血，化膿，糜爛，潰瘍等現象，患猪于是營養不良，急速衰弱，瘦削而致而死。

此病必須經獸醫的檢查，如確實有疥癬蟲的寄生，可先用鉀肥皂與甘油等混合液，軟化皮膚，三小時後洗去，再用那佛脫（ナフトール）、精製硫黃、鉀肥皂、凡士林等混和的軟膏，塗布猪體表面約三分之一（不可全身都塗布），四日後洗去，如此反覆二至三次即可收

治療之效。又用5%硫化鉀水溶液，每日全身沐浴一次，反覆使用數次也有功效。在美國是用1%菸鹼（ニコチン），硫化石灰之軟膏塗布，或用4%的石油沐浴，以十日沐浴三次為度，很有效果。

藥物治療時，應同時以3%克來奧林或克來蘇石鹼液，將猪房及器具徹底消毒。

仔猪的皮膚病最好是及早預防，如能注意猪舍的衛生及管理，保持猪隻的清潔及適當的營養，並常使猪隻在日光下曬曬，實行日光浴，那末就可減少得病的機會。更必須要牢記：「不潔的猪，粗放的管理，惡劣的飼料，是為皮膚病誘發的重要原因。」

胡蘿蔔可以加工貯藏嗎？

問：①去年十月間購買的胡蘿蔔種子，今年還能用嗎？發芽率怎樣？

③胡蘿蔔已達成熟期，但是還想採收出售，怎樣加工貯藏？（雲林縣斗六鎮魏義勇）

答①胡蘿蔔的種子，普通有二年的發芽力，所以去年的種子，如貯藏妥當（須充分乾燥後，密閉貯藏於冷暗乾燥之所），今年秋天還可以利用，發芽率如去年有九〇%，今年約有七五%左右。

②普通胡蘿蔔，自播種至成熟，約四個月左右。但是如無抽苔，五個月後尚有商品價值。所以，可看市價的情形採收出售。

加工法最簡單者為製乾菜。乾燥方法有真空乾燥和熱氣乾燥（永康食品脫水工廠此法）及日光乾燥等。但前二法需設備，普通農家不能實行。日光乾燥法將胡蘿蔔根部洗淨，去皮後切條（細薄片亦可）鋪在淺平的容器晒乾。乾燥時間，如天氣清朗約五日。乾燥度愈高，貯藏期可愈久。又可將乾燥品炒過磨粉，作為咖啡的代用品供食。其他，還可以製成醬菜貯藏，製法與瓜類的醬菜相同。（陳文郁）

長形和短形胡瓜

問：①長形的胡瓜和短形的胡瓜，那一種較好？

②臺北與農種子行所售的南洋目瓜，在中部春季可以播種嗎？（臺中縣潭子鄉林秋江）

答：①長形的胡瓜收量，可能比短形者嚴重。又採收的果形的關係，蟲害（如瓜實蠅等）可能比短形者嚴重。又採收的果形亦可能比短形者不整齊。普通短形的胡瓜，適於採收小瓜的栽培，長形的胡瓜適於採收大瓜的栽培。

②南洋目瓜是屬於短日性的品種，在鳳山試作的結果，二月間播種者，開花結果晚，收量不佳，中部亦應在秋季播種較為適宜。春季播種的品種，還是貴地的臺中目瓜最好。至於鳳山試驗所選出的優良品種，因為種子量不多，尚未正式推廣。（陳文郁）



並狗阿，年一（再）閣了過年一②
開（產財）伙家是但，去死來無
遲經已悔反在現，（光化）離離

（子妻）子某，兄狗阿惜可家大②
，驚免嚙伊勸友朋，聽嚙攏勸苦
。命生有死（不）酌定一

嚙攏寶財銀錢，死會伊着想狗阿②
，離離寶宅厝園口，（要不）治
。戲看兼退退飽食