

栽培洋香瓜，砂質壤土、高溫、乾燥的地方最好。但生長期間，也需要加相當量的水分。洋香瓜也可以叫做西洋甜瓜或外國甜瓜。我在四十五年選擇新竹市北大路雷公橋附近的約二十七坪耕地（前作是小白菜）做試驗，栽培 Preson Delicious 和 H. B. No. 936 兩品種，每品種各育苗二十株。

三月十日深耕。四天後翻土。三月十九日覆蓋稻草而燃燒。燒後剩下的草灰，翻入土中。這樣連續燒兩次後，於同日下午做寬二至二·五公尺，高約二十至二十五公分的畦，在畦上每隔二·八至二公尺開掘直徑四十至五十公分的圓形植穴二十個。每植穴施腐熟堆肥約半小擔和草木灰約一臺斤，和土壤充分混合。


三月二十四日播種。每植穴播五、六粒種子，並充分灌水。以後，到發芽前停止灌水。

四月六日整齊地發出第一幼葉。這時候除去覆蓋的稻草，並應注意連續下雨為害。幼苗期應看土面的乾燥程度酌量灌水。四月十五日，主蔓已長到四、五節。在四節處摘心，留四葉。同時行間拔（每植穴留二株）及中耕除草。然後在葉片上撒佈一%魚藤粉。四月十八日第一次施追肥，用約十臺斤的人糞尿，加四倍的水稀釋施用。四月二十二日第二次施追肥。植穴周圍開掘溝，每植穴施約一臺斤的草木灰。這時每株留生長強壯的三子蔓，其他的子蔓全部摘除。

五月二日，第二次摘心，於子蔓第十節處摘心，並把六節前的孫蔓摘除。五月八日第三次追肥及第二次噴藥劑。這次施用人糞尿較第一次濃，方法和前次相同；並噴石灰波爾多液。五月十日開第一朵雌花，早上八點鐘左右行人工授粉。五月十二日開花很多，繼續人工授粉，並停止灌水。五月十三日第四次追肥（施磷肥），在播種前，用十臺斤磷礦和腐熟堆肥混合，加水，貯藏到這時候施用，每植穴施一臺斤，方法和以（下接十四頁）



楊忠農友



楊武忠農友

英名：{ TOMATO PEARSON IMPROVED
派遜蕃茄，改良種。

新品種最優良，收穫最多！！

生產量：每分地收穫約6,700公斤(12,000台斤)

註：比本省種每分地多穫約 2,000 台斤。

周圍：約壹台尺·直徑：約叁台寸半·重量：約拾肆台兩。

優良種子是農民之生命

種子批發 產證保 農良藥 優良農藥 各種農藥 各並

清河種子行

電話3584号

郵政劃撥儲金第13107号



嘉義市中正路485号嘉義信箱46号

●請認明清河
●歐羅肥經銷處●

綠肥用種子(鐵富豆) 日名テブロシヤ
此種綠肥，肥分勝過太陽麻等一般綠肥，發育形體相同，無論果樹園杉園杉園鳳梨園雞穀園等均可用；肥分充實，是多年試驗合格優良綠肥。

南洋田菁子、田菁種子、想思樹種子、鉤金
種子、虎爪豆子、純扁圓形豆仔薯子(刈薯)
各種菜豆子

經驗一代共七十餘年

瓜子·菜子

藥ヲトド
 豆、早生
 結球白菜
 白仁嫩豆
 儿、各種
 農藥、美
 國和牌萬
 國花菜、
 各種蔬菜
 (蔬菜水稻)