

的危險。

②魚類餵豬，如用少量，是有益的。但用大量，因脂肪過多，使母乳中脂肪含量增高，乳豬吃後，因不易消化，而發生消化不良現象，引起腸卡答兒或所謂「白痢」。

③魚類餵豬很好。細小的骨刺，不會有什麼關係。(省農試所黃立萃)

棉子餅可飼豬

問：棉子餅可以用為豬的蛋白質補充劑嗎？
答：棉子餅可以用為豬的蛋白質補充劑。但是因為棉子餅含有毒素，餵豬時不宜超過總飼量百分之九為要。棉子餅含粗蛋白質三六至三八·五%，同時富於磷的礦物質。(省農試所李登元)

錯誤的配種觀念

問：①有人說異種交尾過的純種母雞，以後雖與同一純種公雞交配，因其體內已潛

有異種血液，所以再不能得到純種的後一代，是否事實？

②飼料終日給與，和按時給與二種方法，何種方法對於產卵為優？

③雞軟便中，常發現有紅色肉塊樣的東西，有時是肉穢細條(但非蛔蟲)。請問這是什麼病症？起因為何？

④未受過白痢檢查母雞之蛋孵出來的小雞，恐發生白痢。請問有何預防方法？

⑤自動粉餵器實用嗎？恐怕會殘留粉未過久而腐敗。(高雄市宏毅二路號陳甲庚)

答：經異種交配後的母雞體內，潛有異種血液的說法，是錯誤的。公雞與母雞交配一次，公雞的精蟲在母雞的生殖器官內，通常在二、三星期內仍有受精的能力。甚在有些例子，達一個月內仍有受精的能力。所以，換一個公雞，或另一品種的公雞，在前公雞交配一個月以後所得的種，就是後者的後裔

了。

②飼料終日給與和按時給與二種方法，各有利弊，終日給與較省工，但飼料多少比較浪費。按時給與法，飼料雖較節省一些，但較費工。要採何種方法，要看自己有多餘勞力及時間了。

③雞軟便中常有淡紅的肉塊狀物，這不是病症。這是雞隻腸內粘膜塊，隨糞而出是不緊要的。

④白痢病除白痢病檢定，發現有陽性或懷疑，予以撲殺淘汰外，別無可靠預防的藥品。但是為預防發生，要定期舉行白痢檢定(每年頂好施行兩次)，同時嚴格保持場地環境清潔衛生，並與外界隔離，以免傳染。

⑤自動粉餵器，每星期定量一次乾粉餵，不致有腐敗情形發生。(李登元)

附答：陳農友詢問濕度計使用法，請參閱本刊七卷三期第十頁(編者)

讀者服務

△徵純散能種乳用仔羊母羊各一隻，最低價函雲林縣斗南鎮新光里北勢亞一四一號李再添。

△徵求美國安哥拉山羊及純種毛用種兔新店鎮大坪林實斗厝路十八號之一杜成之。

△徵求獵犬養犬法訓練法之參考書及養蜂參考書(中、英文均可)，或轉讓，或借閱或介紹。左營律業新村七九號鄭子承。

△廉讓梧桐樹種子四公升(保證新子)臺東縣卑南鄉溫泉村崎頭布店賴李金蘭先生轉交鍾水清。

△廉讓純散能種二至四歲乳母羊三頭，每天可以產乳二升左右。臺南縣新化鎮護國里中山路四十四巷一號盧大存。

△廉讓頂雙溪種母豬，新竹縣關西鎮南山里一五號劉國寧。

△廉讓純白散能種母羊大中各一頭。日月潭水社進水口。(陳振安)

鷄用翼帶標記



(專利字號(45)臺專字第7618號)

方便

可簡省麻煩

可提高工作效率

可時常明瞭各雞
雙情形

用法簡單安全

裝卸簡便裝後安全

美觀

可增加養雞興趣

可保證字號顏色永不退色

誠徵各地經銷處 來函即送樣品

臺南市東區國衛街五號

臺南種雞園

(經改良繁殖純化離合總經)

増産を約束する山本農薬

古い杜壘と 良心的な

殺虫剤 山本 マラソン

殺菌剤 山本 水銀ボルドウ

補助剤 山本 パンナー展着剤

増加殺菌殺虫効力

日本大阪 山本農薬株式会社

台湾總代理 永利有限公司

台北市開封街一段18號 TEL 23606