



廿四日再噴酒一次，共兩次即可。(李登元)

用什麼代替大豆餅

問：本鄉出產優良仔豬，但因近來農會大豆餅配給太少，以致仔豬發育不好，請問有什麼飼料可以代替大豆餅。(桃園龍潭鄉劉均)

答：如市面大豆餅的價太貴，或購買不到的話，可以買花生餅代替大豆餅。目前市面上的脫脂奶粉，價格很便宜，不妨購買代替大豆餅一半量。用蔗糖飼料時，不可一次配合多量，因為蔗糖飼料久置就容易生霉，應加注意。(李登元)

花生種子的問題

問：花生脫殼後，未能即時播種，最多可儲藏多久而不影響發芽率？

答：花生種子混入「賜寶根」藥粉後，如種子用不完，可否當食用？

答：落花生脫殼後種子可保藏於鐵桶或陶器中，並不影響發芽率，但貯藏時間不能超過三個月。

問：落花生種子混入「賜寶根」後，不可作為食用及家畜飼料。拌種前應慎重估計播種量，不妨先將原定種子八成，拌和藥品，以後不夠時再視實際情形再拌藥，以免浪費種子。(林興)

發酵飼料與酵母

問：用發酵過的飼料來餵豬，是否比無發酵的飼料更為理想？

答：發酵飼料更有何？(張水源)

問：一般粗飼料，經過發酵後，組織維散化較易消化。但豬隻利用粗纖維的效率甚低，所以給豬隻的飼料不宜太粗。如用米糠、麩皮、大豆餅、甘藷筴等餵豬，無須經過發酵，新鮮給與較為合宜，因發酵不當，反而使飼料變質。

谷樂生等對洋蔥藥害

問：谷樂生、鹽基性硫酸銅、水銀波爾多、ルベロン乳劑等調製幾倍以上對洋蔥苗及成蔥有藥害？藥害怎樣？如何補救(臺南縣新化鎮鎮誌)

答：谷樂生四百倍ルベロン四百倍均無藥害。鹽基性硫酸銅五十倍亦無藥害。對洋蔥黑斑病的防治，谷樂生一千倍即可，而且效果極好(須每週撒佈一次)；如ルベロン，千倍即可，但ルベロンの效果較谷樂生差。如用硫酸銅，二百倍即可，效果較ルベロン好。谷樂生如有藥害，可能分球多，結球小。硫酸銅發生藥害，在葉上現微黃色小斑點。藥害已經發生無法補救。(孫守恭)

怎樣防治梨樹膏藥病？

問：本人播種的二年生梨，發現樹皮上有紅色的斑點，以後漸漸變成黑色，終於樹皮龜裂而逐漸枯死了。我已把發病的三株切斷燒掉了以防傳染。現在把標本附上。請問這是什麼病？應該怎樣防治。(新竹縣橫山鄉曾賢文)

答：梨樹此種病害俗稱為「膏藥病」，被害的枝幹上生灰黑色圓形的病斑，好像貼上膏藥似的，因此叫做膏藥病。發生這病的原因是由於一種病菌寄生為害。這種病菌是倚靠介殼蟲而生活，病菌在蟲體上取得養分，然後在枝條上生長膏藥狀的菌絲塊，再侵入為害，於是枝條枯萎。防除方法是首先要撲滅介殼蟲。可按照甜橘的防治介殼蟲方法。你將有病的枝條剪下燒掉也是非常有有效的方法。在果樹上的主幹上剛開始發生膏藥狀的病斑時，可用破布蘸些煤油(洋油)用力擦掉，然後再塗上波爾多液。(洪章訓)

食用甘蔗不怕露菌病

問：生食用甘蔗對甘蔗露菌病的抗病性如何？(屏東縣頂鄉莊春同)

答：生食用甘蔗對露菌病具有抵抗性。本省各露菌病發生區域內，沒有見過生食用甘蔗發生露菌病。(糖試所朱學增)

小豬白痢病預防

問：小豬生後十多天，就發生白痢，體弱不肥。六隻母豬中差不多有三、四隻生小豬都有白痢，這是什麼緣故？(金門金湖鄉蓮庵村七鄰二戶呂榮集)

答：小豬生後十多天即發生白痢現象，其原因很多，為①飼料的不適當，而影響母豬所分泌的乳汁；即乳汁內脂肪量增多，致仔豬消化發生障礙。②仔豬體質弱。③管理失宜，母豬患乳房炎。④由細菌的傳染。看你來信的情形，大概是飼料的關係。所以，你得改良飼料，豬舍要保持清潔，多放一點草，使豬體暖和一點。仔豬每日給消炎片(消發吡啶 Sulfaguanidine)〇.五公分，重曹〇.五公分，一日三分內服，數日即癒。(省農試所黃立群)

維護國家資源、造林保林護林 綠化寶島、欲買可靠樹種 請用敝場種子種苗

專營 各種林業種子種苗、四季鮮花種子球根、公園庭園風景設計建造包辦

◎日本柳杉種子、琉球松種子、現貨

敝場四六年春季目錄及大菊山菊目錄及參考資料免費贈送歡迎各界人士索閱者請郵票四角當即投郵奉上無誤

臺北市迪化街二段三〇二巷五號

花房園藝場

郵政劃撥儲金二二三三號

問：鴨人工孵化器內的濕球度數，及溫度應為多少？

答：鴨蛋人工孵化，每天要轉蛋及噴酒幾次。(花蓮市陳良昆)

問：鴨的人工孵化器內的濕球應為華氏九〇度。溫度保持華氏九九度半。

答：開始兩星期內，每日定時轉蛋六至八次。第三個星期起第廿四日止每日四至六次即可。第廿四日以後，即不放無須轉卵，待其啄壳出壳。孵化第十日噴酒溫水一次；第

問：鴨人工孵化器內的濕球度數，及溫度應為多少？

答：鴨蛋人工孵化，每天要轉蛋及噴酒幾次。(花蓮市陳良昆)

問：鴨的人工孵化器內的濕球應為華氏九〇度。溫度保持華氏九九度半。

答：開始兩星期內，每日定時轉蛋六至八次。第三個星期起第廿四日止每日四至六次即可。第廿四日以後，即不放無須轉卵，待其啄壳出壳。孵化第十日噴酒溫水一次；第