

C 或其他藥品消毒。夏天豬虱繁殖得很快，用 DDT 噴射豬體，或用花生油等塗擦豬虱寄生部位，就可驅除。

(3) 驅除蛔蟲 豬的體內寄生蟲，在夏天容易發生。可用驅蟲藥（阿斯卡利肯、肥豬除蟲藥）在仔豬離乳時驅除一次，三個月後再施行一次。

(4) 仔豬下痢 夏季豬隻下痢症發生較多，尤其是離乳後的仔豬特別容易下痢。如發現仔豬瀉痢，即時隔離，放在清潔的褥草上休息，絕食半日或一日，等下痢停止後，才給與少量容易消化的飼

料（麩皮、稀粥、脫脂乳等）。止瀉藥品有木炭末（火炭粉）、次硝酸蒼鉛、抗生素（オレオマイシン）、胺磺劑（グアニジン、メラジン）等，可看實際需要給與或注射。

(5) 皮膚病 夏天高溫多濕，豬隻容易發生濕疹、疥癬等皮膚病。平時應注意豬舍、豬體的清潔，防止發生皮膚病。治療用 5% 來曹皂液（クレゾール）洗淨皮膚後，塗抹硫磺化軟膏或亞鉛華軟膏（詳細治療法請參照本刊第七卷第八期「濕疹與疥癬」）。

杉苗

出芽

難成

活！

— 胡舒寒 —

本刊七卷二期發表「杉木造林的智識」一文後，臺東縣卑南鄉農友鍾水清先生來信說：「本地杉木通常在二月，最慢至三月，就全部吐出新芽，但在這一文裡講，吐出新芽便難成活，而作者同時說，本省南部在三月至五月栽植最好。我懷疑南部三月至五月栽植杉木，是不是太遲了些？」他還希望知道有沒有辦法使苗木延遲吐出新芽？本社特請原作者胡舒寒先生解釋如下。

栽植杉木的適當時期，是在新芽吐出前（即開新葉前）二週間，趁着有雨水的時候，及時栽植。如果等到苗木吐出長長的（一英寸以上）新芽，才來栽植，便難成活。不過，據經驗，吐出些新芽，還沒有關係，同時，如果新芽是從側枝上發出來的，在栽植時，摘除新芽，仍能有希望成活。杉苗吐出新芽的遲早，本省各地都不大相同，這要看當地氣候、苗圃土質、管理狀況，以及播種的先後而定。以作者所居的中部地區來說，杉苗吐出新芽的時期，一般在三月底至四月中，但是也有到五月才開始吐出新芽來的。通常，氣候溫暖、苗圃土質好、管理認真而播種得早的，吐出新芽的時期早；不然，便要遲些。鍾農友住的臺東，既然在二月至三月就全部吐出新芽，栽植時期，請看苗木實際的情形來提前。

使苗木延遲吐出新芽的方法，有雪坑（或水窖）貯藏法、冷藏法，和假植法三種。但是雪坑貯藏法和冷藏法在臺灣不能辦到。

假植法是選擇庇蔭處掘溝，溝的深度看苗木的長短而定，在溝內緊密排列苗木，根部用苔蘚和土壤掩蓋，並注意隨時澆水，這樣就能延遲吐出新芽。

(6) 日射

濕熱的豬舍，沒有遮蔽的運動場，豬隻互鬪、疾走，都會使豬發生日射病。發生日射病的豬隻，應移在涼爽的地方，用布袋或其他東西浸水後覆蓋在豬頭部豬體，並注射強心藥品。

(7) 預防注射 夏天豬瘟、豬丹毒、腸炎等傳染病發生特別多，應注意預防注射，防止傳染。



豬舍內及體諸常消毒

乳羊與安哥拉山羊

撒能種乳羊與安哥拉羊均屬山羊，與本地種山羊性質相近。適合飼養土種山羊的地方，當然可以飼養乳羊及安哥拉山羊。但因撒能羊係供乳，安哥拉專產羊毛，所以，飼養上除放牧食草外，於泌乳時或剪毛後，均應供給少量飼料如豆餅麩皮等。又雨量較多的地區，也不宜飼養乳羊及毛用山羊。撒能種乳羊，臺中市北區大同路富山乳羊場有售，每隻仔羊（四個月大）約五、六百元。安哥拉羊種，除按照臺灣省農林廳所規定的貸放辦法，向政府申請貸放外，在本省還沒有辦法買到。

乳羊每年可繁殖一次，每次二頭或一頭。安哥拉山羊多一次產一頭。以五、六隻母羊開始，至少須三年才能變成二百隻的羊羣。（農復會畜牧生產組答嘉義縣吳鳳鄉金仁禮農友）