

物美，且具伸展性，可不阻碍果實的發育，所以可推廣應用。

三、套袋的適期

套袋時期不可過晚，太晚則效果減少，蟲害漸多，過早又恐有碍結實，最適宜的時期是果實大如花生仁的時候舉行。可分時期的不同而利用袋的種類，未開花時期即可開始套袋，但要用布袋（麻紗）才可以得到滿意的結實。在此早期套袋應用布袋可得百分之八十至九十的結實率，如用新聞紙則只有百分之四十到五十的結實率。棕片則不可提早應用，如果在未開花時套上，落果甚為利害，結實率甚低。因此棕袋可在結果以後應用，在開花前應用布袋，開花後應用棕袋，即三月上中旬花已抽穗，可開始應用布袋，四月上中旬可應用棕袋套之。

調節市場供應的

紅洋蔥

郁宗雄

本省現有的紅洋蔥品種名紅克里兒 (Red Creole)，屬扁球型，球形本是小形（一至三臺兩），皮紫紅色，肉質緊實，肉色白中帶紅色，是晚生種，這種品種的氣候適應性和「早玉」「黃勝」等品種不同，如果在八、九月早播時，分球率（尤其在南部）和抽苔率（尤其在北部）很高，結球率很低，毫無栽培價值；如南部在十月初以後，中部在十月中旬以後，至十一月底晚播時，則分球率和抽苔率都逐漸降低，結球率逐漸增加，球形逐漸變小，但都有栽培價值。

紅洋蔥因含高量辣素，辣味很強，所以特別耐貯藏，是貯藏品種；南部在三月下旬起收，中部四月上旬起收，北部在四月下旬起收，收後應好好貯藏，等「黃勝」「早玉」等不能


貯藏的品種落市後，再將這品種應市，售價非常高，收益可能比「早玉」等更多，對於市場的供應調節功用尤大。該品種將來在中部可能用密植栽培最適合。

洋蔥如已抽苔則葱球就不再長大（未結球的就不再結球），同時抽苔後之葱球不耐貯藏，如見有抽苔應即收穫，收穫後即出售，但這時出售非常吃虧，所以治標不如治本，栽種本品種要晚播。

洋蔥在剛抽苔時即宜收穫，花梗尚可食用，如花梗長得粗長後，就變得粗硬不可食用了。

本品種對於黑斑病和薊馬的抵抗力特別強，所以在本省平地是惟一可以採種的品種。

（本文是郁宗雄先生應蔡水鄭、張慶鑑二農友之詢問而作。）



小姨會用(可以)嫁姊夫，怎樣
的餽使(不可)做弟婦，因為老
想舊，險誤了(他們)親事。



⑤ 毒藥食無了(不久)久，趕緊
將伊返送醫，好得緊救生命，
若無二人歸陰府。



④ 這風俗無理，婚姻成(不成)
成，死如不(成)去，買毒來食
去，離分不毒服雙雙。