

# 咬蛇被畜家防謹

—遠樹劉—



家畜在田間耕作，樹林中休息，或在牧地草原上放牧的時候，常有遭遇到毒蛇咬傷的可能，就是在廐舍裏，往往在深夜也會有毒蛇闖入屋內，而受傷害。

如果家畜遭遇到毒蛇咬傷後，能立刻施行適當的處置，還可以救治。幼小的家畜及鷄鴨等因身體抵抗力弱，在被咬到後，就立即死亡；至于普通的大家畜，被咬後就有血液繼續不斷的由傷口內滲出，局部皮膚顏色變為暗赤或青紫。腫脹灼熱，家畜顏貌憂苦，呻吟苦痛，跛行或不能運動，伏臥或不能起立，最後全身麻痺而死。

治療法，是將患者移入于通風蔭涼之處，在咬傷後十分鐘內，用利刀切除被咬處，使其毒素不致散佈全身，可保患者性命安全，但時間稍遲延就無效。或用濃石炭酸、硝酸銀棒、苛性鉀、濃氫水、過錳酸鉀、烙鐵充分腐蝕、破壞傷部組織。倘若被咬處為四肢等下端部位，宜急用綑帶，布條或繩子緊縛傷口之上方，可阻止毒素的上行。縛紮妥當後，用利刀將傷處切成十字形，深約寸許，然後不斷用力將毒血擠出，每隔十五分鐘可將縛帶放鬆一次，然後再施行縛紮擠出毒血，每次再縛紮時，其位置可略上移，如是繼續不斷的施行，能將其進入體內之毒素全部擠出，約經十數小時後，就可將縛帶卸去。

被咬傷的家畜，如有心臟衰弱或精神萎靡等病狀，可以灌服咖啡或酒類等飲料。最好請獸醫師注射蛇毒血清或其他藥劑，或在必要時實行輸血，[靜脈注射葡萄糖液、生理食鹽水及強心劑等。

事前的注意預防，可以減少蛇咬的機會，預防法如下：

- ① 家畜在山林或田野間耕作、休息或放牧時，看到蛇後，須趕驅遠避。
- ② 雜草灌木叢中及各種地面洞穴，是毒蛇棲息的場所，須設法引火燒燬，或用泥土填塞蛇洞。
- ③ 廐舍附近及牧地，須保持乾燥清潔，注意排水，清除田垠畦畔之雜草，以免毒蛇棲藏。
- ④ 建築畜舍時，周圍牆基須用磚砌，至少有一公尺高；地面之空洞及牆腳下之空隙，須用泥土填塞，以免夜間蛇類自戶外潛入畜舍內，尤其在郊外之畜舍更應注意。
- ⑤ 如發現廐舍附近、牧地或耕作用地上有毒蛇出沒存在時，須設法驅除或誘殺。

## 有毒農藥要注意

慶章文  
壬酉畫



明發，(家學科)人學科明文在現①  
年年要若，(劑蟲殺)蟲治來藥農  
望有就藥農了用，(年豐)冬年好

拌)藥臘手用，兄厓阿位一中村②  
泡凸來後，(怕不都)驚嘍擺(藥  
兄德正會農尋去，(毒中)痛悶又

送，(驚一吃)驚一越見看德正③  
真是害厲藥農，聽伊講卅手他  
影無講通嘍萬千，(在實是)正  
。(信不可不)