


種兩法定固體豬

欣聯張



(下向側右)形情的定固臥橫：一圖


小孔，做成一個圈(圖三)，把圈的一邊(乙)套進豬的上顎，然後拉繩子的長端，縮小環圈，在豬的上顎，於鼻梁上緊縛，使繩子緊縛在豬的上顎犬齒不易脫落。繩子長端縛在附近樹木或豬舍的柱桿等，這時豬只想後退不知前進，所以可緊緊的固定豬體。手術後，把繩子短端向上拉，環圈就自然鬆解。

小豬、中豬的手術，及雌豬去勢時

可用「橫臥固定法」。準備竹桿一枝(直徑七分至一寸，長七至八尺)，黃麻繩一條(直徑三至四分，長十尺)。先把黃麻繩的尾端結紮在竹桿上，放在地面，然後把豬直放在竹上(此時豬的胸部必須向繩子的結紮點，豬的肩胛線與竹桿應成一直線)。固定左側向下或右側向下都可以，但雌豬去勢時普通是右側向下，右側向下的保定法如下：繩子繞過豬的左胸後，由頭部穿過豬背部下竹桿，迂回至左顎，由左顎圍繞右顎後，拉緊繩子(拉得頭部稍向上)，然後通過左前肢的腋窩，再穿過背部下面的竹(若是連續保定二頭，由此開始第二頭的保定)，再圍繞嘴，簡單地結在頭上繩子的交叉點。用一個腳踏竹桿，豬就不易爬起亂動了。



形情的定固部鼻：二圖



子繩麻苧的用法定固部鼻：三圖

豬要灌藥、去勢、灌腸、灌飼料、採血、手術或注射時，必須先把豬體固定不動，使工作容易進行。這裡介紹簡單而確實的豬體固定法兩種。

大豬、中豬的外科手術、灌藥、灌飼料，或採血、注射時，最好用「鼻部固定法」固定豬體。準備一條直徑四分，長七至八尺的苧麻繩子。把繩子的長端穿過繩上的另一端

四十五年度美國原種在臺灣採種

英名：TOMATO PEARSON IMPROVED

派遜蕃茄，改良種。

新品種最優良、收穫最多！
 生產量：每分地收穫約六、七〇〇公斤(三、〇〇〇磅)
 註：比本省種每分地多獲約二、〇〇〇磅斤
 每粒周圍：約一臺尺、直徑：約三臺寸半、重量約十四臺兩

種子、瓜子、菜子：純扁圓形豆仔種子(刈薯)

各種菜豆子、純三十五天早生黑葉包心白菜子、純四十五天中生大葉黑包心白菜子、純四十五天極早生花椰菜子、純五十五天早生白花椰菜子、純中生白結晶花椰菜子、長岡交配一號甘藍菜子、純員林產四十日長種馬耳松菜頭子、油甘菜子、純黃金白菜子、早生扁甲介菜子、美國大心萬仔菜子、純黑皮大長刺瓜子、純鳳山改良白菜子、純正虎耳特大葉荷蘭菜子、純黃心芹菜子、白仁敏豆子、東和牌噴霧機、各種農藥

優良種子是農民之生命
 各種優良農產種子
 並農藥保證批售
清河種子行
 電話 3584 號
 郵政劃撥儲金票 13107 號
 請認明清河
 歐羅巴商標
 經驗 代共七十餘年
 嘉義市中正路 485 號 義信箱 46 號

美日特許 水稻增收特效藥

士蘭師扶朗多旺

効力：促進發根、健康幼苗、增加分枝、提高收量
 每甲一畝保證豐收

- 根多旺** 種子接木插木用
- 蕃茄多旺** 防止トマト落花落果用
- 果實多旺** 防止果實及瓜類落花落果用
- 殺草劑 2.4-D「石原」** 水田及早田殺草用

◎說明書函索即寄，請附郵票四角

石原產業株式會社

總代理店 **大豐農藥行**

臺北市寧夏路23號 電 4 2 1 6 1 號