


## 鳥肥肥效慢

問：我在砂質壤土種甘蔗四分地，四月一日土壤尚有濕度，施用二十五公斤裝鳥肥一小包，用塑膠土。十四日後下一點雨，然後一直亢旱，甘蔗部份凋萎。到五月十三日下雨甘蔗才蘇生。此間，甘蔗發育生長不佳，請問當時所施用的鳥肥肥分是否大部份已失去？（虎尾鄭永慶）

答：照來函所述，所施用的鳥肥肥份，並沒有大部分失去，而是沒有分解為作物所利用，所以肥效不顯。鳥肥必須分解後，才能被作物吸收利用，至於分解的快慢，要看氣候、土壤性質，及水分多少，和施用方法而不同。你在四月，氣溫還低時，單獨施用鳥肥，以後又一直亢旱，而且是砂質壤土，鳥肥分解當然比較慢，而甘蔗生長就不好。（梁鉅榮）

# 養鷄智識測驗題 獎金一萬元

甲  
正題



1 上面甲乙兩隻母鷄從體型來觀察那一隻會多生蛋。

2 請填下列□內的字。

國際家畜藥物廠出品的禽藥有A.禽疫防治特效藥「安□素」B.發育生蛋促進劑「利□素」C.雛病迅效成鷄熱症及痢疾藥粉「□畜淨素」驅蟲劑「禽□素」四種。均達國際水準的良藥。

經中央政府正式化驗合格准予製售的國產豬蟲驅除專藥，其藥名題是「猪□靈」

資格：凡將上列測驗題填寫並附本廠出品中一種之藥品空袋或標頭楷寫明白住址姓名寄臺北縣板橋鎮館前路本廠收（如不附寄空袋或標頭者恕作無效）

名額：凡全部測驗題答對者為得獎，倘得獎人一人以上時則將獎金一萬元平均分配並作抵購藥品。

期限：自本日起至本年十一月三十日止以戳郵日期為憑。

公佈：民國四十六年十二月一日刊登答案。

國際家畜藥物廠

## 落花生白絹病

問：落花生開花後不下雨，施行地面灌漑後却降雨不停，莢葉繁茂，發生「大粒白絹病」，如何防治？（虎尾鄭金生）

答：落花生生白絹病發生後很難防治，如果田間已發現病株，不可再施行地面灌溉，以免助長此病蔓延。掃除靠近花生莖部的落葉可減少被害。最好的預防方法，應行種子處理及施行輪作。在播種前如能清除田間的落葉，此病也不易發生。（洪章訓）

## 落花生徒長還會結實

問：落花生生育初期因欠水分，生長不良，到近半月來，因下雨才向上很快的成長，使花生莖變得軟弱，而且很茂盛，會不會影響將來的結實？如果會影響，可用什麼方法預防結實？（新竹市周連壽）

答：據說留種用的蒜頭，假如摘去花，會引起變種，這是不是事實？（雲林縣莿桐鄉詹寶裕）

答：摘除花蒂後留種的蒜球，不會變種，但恐貯藏力較差。（陳文郁）

問：落花生有三個種子，兩個種子，也有一個種子的。是不是可以選出三種子的來留種，得到更多的收穫？（新竹市周連壽）

答：落花生每莢種子的多少，雖然是品種的特性，但同一品種中，每莢種子數也是不同的。選用三個種子的真實，留作種子用，後代的每莢種子數還是可能三個，二個以至一個，不能因此而增加產量。（林興）

## 蒜頭摘花留種

問：據說留種用的蒜頭，假如摘去花，會引起變種，這是不是事實？（雲林縣莿桐鄉詹寶裕）

答：摘除花蒂後留種的蒜球，不會變種，但恐貯藏力較差。（陳文郁）

問：桑樹除用葉養蠶外，木材有沒有用處？（臺東縣東河鄉何雨霖）

答：桑樹木質堅硬經用，尤耐磨擦，栽植成林後，小的多做為車轆，各種農具，及其他用器等，大的可製成木板、木條，用做建築材料，價值在柏柳之間。（管璣）

## 桑樹的用途

問：桑樹除用葉養蠶外，木材有沒有用處？（臺東縣東河鄉何雨霖）

答：桑樹木質堅硬經用，尤耐磨擦，栽

植成林後，小的多做為車轆，各種農具，及其他用器等，大的可製成木板、木條，用做建築材料，價值在柏柳之間。（管璣）

問：晚育西亞橙有幾種？

答：晚育西亞橙有幾種，在南部乾燥沙質地可否栽植，一年生及二年生種苗每株價量，發芽率九〇%左右。（三義鄉農會）

問：晚育西亞橙有幾種？

答：晚育西亞橙有幾種，在南部乾燥沙質地可否栽植，一年生及二年生種苗每株價量，發芽率九〇%左右。（三義鄉農會）

問：晚育西亞橙有幾種？

答：晚育西亞橙有幾種，在南部乾燥沙質地可否栽植，一年生及二年生種苗每株價量，發芽率九〇%左右。（三義鄉農會）

## 落花生的種子數不同

問：花生有每莢三個種子，兩個種子，也有一個種子的。是不是可以選出三種子的來留種，得到更多的收穫？（新竹市周連壽）

答：落花生每莢種子的多少，雖然是品種的特性，但同一品種中，每莢種子數也是不同的。選用三個種子的真實，留作種子用，後代的每莢種子數還是可能三個，二個以至一個，不能因此而增加產量。（林興）

元。（蔡致謨）

格若干？（臺南縣玉井鄉張天德）

答：晚育西亞橙原來只有一個品種，後來因經過多年栽培，才分離出許多系統，如無核晚育西亞橙等。晚育西亞橙可以在南部砂質壤土中栽培，但必須土層深厚，排水良好。一年生苗約四、五元，二年生苗七至十元。（蔡致謨）