

栽一畦，每畦栽五十株，要種子二百粒。

(3) 栽培要點：育苗和栽培方法和花椰菜大致一樣，但株距為四十公分；定植後七十五天起收，日本種結球後可在田間留置二個月隨時備用。

十、芹 菜

(1) 優良品種：①黃心種，②海南種。

(2) 播種適期：八至三月，早播須遮強光。

(3) 栽培面積和種子用量：八月上旬、九月中旬、十二月中旬各播一畦，每畦用種子二公分。

(4) 栽培要點：直播，種子加砂土五十倍混和後撒播。播後不覆土，但要用木板鎮壓，再蓋草。發芽後除去蓋草，絡續除草間拔，最後株距約為十五公分四方。生育期中禁用糞尿。追肥宜用硫酸銨，加澆水二百倍，每星期代替澆水施一次，施肥後再用澆水沖洗葉面，共施三至四次，共用硫酸銨五百公分。播種後三十天開始逐漸間拔採收。

十一、苜 蓿

(1) 優良品種：大葉種(虎耳)。

(2) 播種適期：八至三月。

(3) 栽培面積和種子用量：間作為主，八月中旬播種一畦，九月上旬、十月上旬、十一月中旬、三月下旬各在甘藍、菜豆、番茄等畦內間作一畦。每畦種子用量十六公分，間作時減半。

(4) 栽培要點：直播；用撒法播下，覆土○五公分，稍鎮壓後蓋草。發芽後，太密的地方要逐漸勻拔。生育期中注意除草澆水。每星期用硫酸銨二百倍溶液代替澆水，再用澆水沖洗。不要施用糞尿。播種後三十天開始收穫，間作時整株拔起，普通栽培時摘採嫩頭。

十二、甜 椒

(1) 優良品種：①路畔金(Ruby King)薄肉早生。②加州王(California Wonder)厚肉晚生。

(2) 播種適期：北部一至四月和八至十月；中南部八至二月。

(3) 栽培面積和種子用量：八月上旬、九月中旬、(只南部)、一月上旬、二月下旬各播種一次。育苗後照計劃圖各栽一畦六十六株，種子用量二百粒。

(4) 栽培要點：苗床育苗法和花椰菜相同，但苗期較長，要四十至五十天。木葉七至八片時定植，一畦栽二行，株距三十公分。栽植管理方法和番茄相同，但不摘芽整株，也不插支柱。栽植後五十天開始收青果；果實已長大但未變色前為適熟。一作可收三至四個月。

註：詳細栽培法請看本刊第十六卷第十六期第六頁。

十三、胡 蘿 蔔

(1) 優良品種：①錢得納(Chantenay)

②紅心錢得納(Red Cored Chantenay)，③臺維斯五十(Danvers Half Long)，④甜而軟(Tender Sweet)。

(2) 播種適期：九至二月。

(3) 栽培面積和種子用量：九月中旬、十一月中旬、一月下旬各播一畦，每畦需種子六公分。

(4) 栽培要點：直播。一畦栽四行，行上用鋤頭開鋤口寬、二公分深的淺平溝。種子用濕條播，每條播種子一·五公分，混和砂土五十倍

後播下，薄薄蓋土，再蓋草澆水。發芽後除去蓋草。苗期常淺中耕除草，注意澆水。苗期絡續勻拔過密的苗，至二個月時，拔到每行剩一五○株左右。發芽後，每二十天施追肥一次，共三至四次，每次用硫酸銨二百公分，硫酸鉀五十公分，作成液肥澆施行間。生育期中，薄薄培土根部數次。根部肥大後，尤須培土，不使根肩露出土面，以免變色。播種後八十天，可絡續間拔密生株供食，以後可絡續收二個月。(未完，下期續)

◎美國、日本、等四十六年產各種蔬菜種子，花卉種苗，已經進貨!!

◎各種最新強力殺蟲劑、防治病藥、植物ホルモン及園藝農具等生產資材均有

△詳細希閱本公司四十六年度總目錄(目錄附有詳細品種解說)目錄附郵票壹元函索即寄

◎有 望 的 農 家 副 業

一面製造堆肥，一面可以收利的副業是「栽培草菇」草菇栽培容易，收利濃厚。本公司出售之種菌已獲得栽培成功各地已有新鮮的草菇登而受外省同胞歡迎

草 菇 (フナタケ) 種 菌 現 貨 供 應

(每坪分包含運郵二十五元正) 其簡易栽培法說明書附郵票四角即寄

輸入元：臺灣農產企業公司 直賣部：臺灣農業資材公司

副總經理：臺灣一二七九九號 電話：四四二五三、四三三六五 地址：臺北市迪化街一段八六號