

馬拉巴栗的栽培和加工

張振宙

馬拉巴栗(マラバールチエストラット)適宜於本省中南部栽培，種子加工後，風味香脆可口，很受市場的歡迎。

一、三種繁殖法

馬拉巴栗很容易繁殖，實生、扦插、嫁接均可採用。實生繁殖時，把採下的果實放在陰涼處乾燥，數日後，果殼自然裂開，取出種子播入苗圃。新鮮種子，在室內貯藏數日就霉爛，晒乾後又失去發芽力。所以，經過貯藏或晒乾的種子不可做繁殖用。

播種用苗圃，必須陽光充足，排水良好，土質以輕鬆、肥沃砂質壤土為佳。播種前，土壤需先深耕，整理細碎，然後耙平作畦。苗床寬度以四尺為宜，高度以四寸至六寸為宜；過低時，排水不良，阻礙幼苗根部的發育。長度以不超過三丈為宜。

整理苗床時，應加入適量的腐熟堆肥，與土壤充分混和。播種深度以一寸為宜，株間距離為三至五寸，行間距離為六至十寸。種子播好後，床面需加蓋稻草或其他草藁，保持土壤濕潤，防止生雜草及土壤沖刷。

土壤濕潤時，播種第三日開始發芽。幼芽出土時須把數蓋稻草向幼苗兩旁略予分開，以免壓伏幼苗。天氣乾旱時，須時常灌溉。

七、八月成熟的種子(第一期開花所結之果實)最充實，最適於播種用。播種時期，也是七、八月最適宜。這時播種所育成的幼苗，至翌年二月可掘起移植一次。移植苗床的整理及處理與播種苗床相同。移植的株間距離為五至八寸，行間距離為一至一·五尺。移植後，須時常注意灌溉。

溉。至五月時，可施肥料一次，如用硫酸銨或硝酸銨，每甲地施用二〇〇至二五〇公斤，看苗的大小增減。至九月或翌年二月定植。

扦插與嫁接，均須於每年二、三月實行。扦插苗根系發育多不良，生長緩慢，應少用。嫁接很容易成活，砧木可採用馬拉巴栗或與馬拉巴栗同科的斑芝棉。

二、理想的土地

栽培馬拉巴栗的土壤，須土層深厚、輕鬆，排水良好，砂質壤土最適宜。積水、堅實的土地，不適於栽培馬拉巴栗。



馬巴拉栗的果枝、花和種子

定植時期為每年二月及九月。定植距離為五至七公尺，看土壤肥沃情形而定；肥

沃土壤距離較大。

馬拉巴栗主根發達，定植時掘穴應較寬大，以定植時根部能自然舒長為度；普通一年生幼苗所需植穴的直徑與深度為一·五至二·五尺。覆土中最好混入適量的腐熟堆肥，增加土壤肥力，促進幼苗生長。覆土上須加蓋草藁，保持土壤濕潤，防止表土硬化。乾旱天氣，需時常灌溉。

山地栽培馬拉巴栗，坡度應在十五度以下，耕作管理應儘量避免土壤沖刷。

(未完，下期續)

• 新自美國進口 • 廉價現貨供應 • 保證品質優良 •

好速牌馬拉松乳劑

ORTHO Malathion 5 Spray (馬拉松乳劑)

彰化市 中正路 395 號
(即公路局邊) 電話: 376

泰裕農藥工業原料行