

農家自給菜圃

—— 郁 宗 雄 ——

(續上期)

十四、分葱

(1) 優良品種：四季葱，大頭葱(珠葱)。

(2) 播種適期：八至二月。

(3) 栽培面積和種葱球用量：分葱能耐陰，生育期又短，適於間作，不另設畦。八月上旬、九月上旬、十月上旬、十月下旬、一月上旬、二月中旬各間作一畦。每畦種球用量三〇〇至五〇〇公分。

(4) 栽培要點：豇豆、豌豆、甜椒、甘藍等主作物栽種後，就在行株間空隙的地方播種葱球。株距十二公分，每一株距播種種球二至三小球，頂芽向上，微露出地面。中耕除草澆水施肥等，和主作物同時施行。栽種後四十天開始陸續收穫。

十五、南瓜

(1) 優良品種：木瓜型種。

(2) 播種適期：八至三月。

(3) 栽培面積和種子用量：利用廢地栽種或做涼棚，或利用圍籬或畜舍做瓜棚栽培。栽種四至八株，需用種子十二至二十四粒。

(4) 栽培要點：絲瓜枯時十月栽種，每株間隔六平方公尺。挖掘植穴深潤各五十公分，施下堆肥六公斤，糞尿二杓，過磷酸鈣一百公分，混合園

土後播種。每穴播種子三粒，三粒種子成三角形，平放，播入土中一公分深，以後適宜澆水。發芽後防蟲。本葉五至六片展開時，每穴只留一株。生育期中每半月施糞尿(加水一倍)一次於穴內。如用棚架栽培時，引蔓上棚或籬笆。雌花開花後，用蠟信封套住，以免因蟲害使果實腐爛。栽種後三個月，果實開始成熟後採收，可繼續採二個月，到二至三月收完，接着種絲瓜。果實可貯藏一至二個月。

十六、卷心白菜

(1) 優良品種和播種適期：①本地種：彰浦早生：北部八至九月和和三至四月，中南部九至十月和二至三月；彰浦晚生：北部八至十月，中南部九至十一月播種。②日本種：京都三號，長岡交配二號，十一至二月播種。

(2) 栽培面積和種子用量：

十月下旬播種育苗，一個月後栽一畦；種子二百粒。

(3) 栽培要點：

播種育苗和花椰菜相同，本圃一畦栽二行，株距本地種四十公分，日本種五十公分。栽培管理方法可仿照甘藍。生育期注意蚜蟲，定植後本地種四十天開始收穫

，日本種八十天開始收穫。

十七、蠶豆(馬蠶豆)

(1) 優良品種：新竹育二號。

(2) 播種適期：中北部十至十一月，南部栽種收量太少，不宜種植。

(3) 栽培面積和種子用量：中北部十月下旬播種一畦，每畦種子一百粒。

(4) 栽培要點：直播，一畦栽二行，株距四十公分，每穴播種子二粒，平放，上蓋灰土二至三公分。播種後每隔一個月中耕除草培土一次，共施行二次，每次培土二至三公分。生育期中注意澆水，不使太乾。追肥用糞尿，依生育好壞施用二至三次。播種後四個月，開始收穫鮮莢，剝取肥大而未硬化的種子供食。採收期間約一個月。

(未完，下期續)

鳳梨的種植密度

—— 致 察 ——

現在栽培鳳梨，多儘量採取密植方式。在鳳梨盛產地夏威夷，已密植至每甲栽四三、〇〇〇株。密植後，果形減小，但單位面積產量大增。鳳梨密植以後，雜草減少，除草工作可以節省很多。但每甲施肥量必須照株數比例增加，同時須注意防治病蟲害，才會有良好的成績。

估計五年一個更新期，三回收穫每甲可達七、八十噸。

鳳梨的 畦間距離 行 距 株 距 每甲栽植苗數

栽植通常以 四尺五寸 一尺八寸 一尺 三三、五三一

二行式管理 四 尺 二 尺 一尺二寸 二九、三四〇

最方便。二行式的種植距離和 四 尺 二 尺 一尺 三五、二〇八

栽植株數關係如下表：

鳳梨密植至每甲三萬五千 四 尺 一尺八寸 一尺二寸 三〇、三五一

株至四萬株，第一回夏果產量 三 尺 二 尺 一尺 三五、二〇八

每甲不會少於四十噸(不是五 三 尺 一尺八寸 一尺二寸 四二、二五〇

年平均數字) 三 尺 一尺五寸 一尺二寸 三六、六七五