

兩種品質好的小白菜

· 王進生 ·

小白菜是很有栽培價值的蔬菜。但過去我們所栽植的土白菜、鳳山白菜，品質却不能說好。這裡介紹二種小白菜，很能適應本省的氣候和土質，在夏秋季葉菜類缺乏時期栽培，非常適宜。

一、一般特性

這二種小白菜的特性如下：

(1) 江門白菜 株型和高脚白菜相似。葉柄很厚，純白，纖維少。葉色濃綠，葉身稍寬，質地柔軟。比土白菜味美可口得多。耐病性、耐濕性都很強。在驟雨多的盛夏，其他的小白菜都容易腐敗，江門白菜却不易腐敗。

(2) 金門大白菜 株型與江門白菜相似，葉稍薄，纖維也少，葉為綠色，品質很好。對雨稍為弱一點，抗熱性也略為弱一些，適於初秋播種。

這二種小白菜，可以在任何土地栽培。最好是肥沃的砂質壤土、植質壤土；稍為瘠瘦的地方，只要多施些肥料也可栽培。


二、適時的栽培

一般用直播法栽培，但初秋也可用移植法。播種期是三至九月，但最適期是三至五及八至九月。

(1) 直播法 為了減少水分蒸發和日光照射，應作平畦栽培，並且應該密植。

整地完了後，把準備好的種子撒播或條播，然後覆土一至二分。播種前，在平畦全面澆發稀釋的腐熟人糞尿，可使初期生育良好，但濃度絕不可過濃。在生育過程中，應間拔三次，使株與株之間，

留清葉與葉不致互相重疊的株間。第一次間拔在發芽後五至六日舉行。第二次在第一次後一星期，第三次在第二次後一星期舉行。間拔時，同時施用稀薄氮肥，促進生育。間拔要在適當的時期施行。最後的株距，能影響株的大小，所以應該看市場的嗜好，來決定間拔的程度。



菜白東山、菜白大門金、菜白門江、菜白脚高 (左至右從)

初秋比較冷涼時，宜用移植法栽培。先育苗，至本葉三枚時，定植於本圃，株距二十公分，育成大株。

(2) 移植法

移植時，可充分施用腐熟的堆肥和人糞尿。

三、肥培管理要點

(1) 施肥 在基肥外，分施三至四次追肥。每十公畝地(一分地)所需要的三要素量約為：氮素十六公斤，磷酸五公斤，鉀質八公斤。除堆肥外，腐熟人糞尿、尿素或硫酸銨都有很好的效果。

基肥在整地後做畦時施用。第一第二及第三次追肥在間拔時施用。第四次看生育狀況適當施用。不足，小白菜的滋味就不好，但給水也不可過多。

(2) 澆水 清早及傍晚葉面澆水，如果水分

次。小白菜的生育日數很短，第三次間拔後的藥劑噴射，宜改用魚藤精或尼古丁。但使用尼古丁的時候，假使濃度調配錯誤，葉身會被燒焦，要特別注意。被茶心螟幼蟲侵害時，生長點失去，茶因此不能長大。蚜蟲為害劇烈時，會引起萎縮病，外觀很不好看，且生出一種苦味，所以，噴射藥劑的次數，須看害蟲發生程度如何而定。

軟腐病在氣溫攝氏三十度，且濕度高的時候蔓延，要

澈底驅除黃條虱葉蟲，防止病菌從噬食的傷口侵入。初秋作移植栽培時，常有露菌病發生，可每隔七至十日噴射一次大生四〇〇倍液。

(3) 病蟲害 茶心螟為害很多。蚜蟲也不少。所以，發芽後每隔四至五日，要噴射馬拉松二、〇〇〇倍液一

