

農家自給菜圃

—— 雄 宗 郁 ——



(續上期)

十八、番茄

(1) 優良品種：① 早熟矮性：普利佳 (Pritchard)，夏威夷一號 (Nihau) (耐熱)。② 晚生高莖：勃里克·沃薩 (Break-O'-Day)，比爾勝 (Pearson)，馬娜里 (Manalee) (耐熱)，馬娜露苗 (Manaluce) (耐熱)。

(2) 播種適期：北部九至三月，中南部九至一月。

(3) 栽培面積和種子用量：九月上旬、十一月下旬、十二月下旬、二月上旬各播種一五〇粒。育苗後各栽一畦，每畦栽五十株。

(4) 栽培要點：育苗法仿照花椰菜的方法。育苗期在高溫期二十五天，低溫

期四十天。苗高十二公分，本葉四至五片時定植，帶土掘苗，一畦栽二行，株距四十公分。植後每隔約二十天施人糞尿一次。生育期中隨時摘去側芽，只留一頂芽生長。每株旁插細竹一枝做支柱，支柱長一百公分(矮性種)至一百五十公分(高莖種)，隨時把蔓縛上支柱。灌水不宜過多。中耕除草，病蟲害防治要及時施行。栽種後五十至六十天開始採收，可收四十至五十天。

十九、豌豆

(1) 優良品種：臺中九號，絹莢。

(2) 播種適期：九月中旬至十一月。

(3) 栽培面積和種子用量：九月下旬(北部)、十月上旬各播一畦。每畦用種子七十公分(三百粒)。

(4) 栽培要點：一畦栽二行，株距二十公分，栽培法和豇豆一樣。豌豆能耐乾，灌水宜稍少。播種後六十天開始收穫嫩莢。

二十、絲瓜(菜瓜)

(1) 優良品種：① 米管種(短筒種)，② 秤擔種(長筒種)。

(2) 播種適期：北部二至四月，中南部一至四月。

(3) 栽培面積和種子用量：和南瓜、菜豆輪作，但植穴位置應變換。北部三月南部二月播種四至八株，需要種子十二至二十四粒。

(4) 栽培要點：選日光充足的地方，栽種法和南瓜相同，但一個植穴可留一至二株，施用糞尿量應比南瓜多一倍。雌花開花後，用信封或大紙袋套住，以免受蟲害腐爛。早播的約經七十天開始收穫，晚播的約經一百天開始收穫，陸續可收一八〇天，至秋涼後枯死，再栽南瓜。

二十一、菜豆(蠶豆)

(1) 優良品種：① 矮性種：矮生無筋綠莢 (Asgrow Stringless Green Pod)，軟莢 (Tender Pod)。② 蔓性種：白仁種 (White Creaseback) (白花)，黑仁種 (紅色)。

(2) 播種適期：矮性種九至四月，蔓性種北部九至十月和一至四月，中南部九至三月。

(3) 栽培面積和種子用量：矮性種十月上旬栽一畦，蔓性種九月下旬(南部)、一月中旬、三月下旬、三月中旬(北部)各播一次栽一畦；每畦種子用量，矮性種四五〇粒(矮生無筋綠莢一八〇公分，軟莢一一〇公分)，蔓性種一五〇粒(十八公分)。

(4) 栽培要點：矮性種一畦栽三行，每行條播一五〇粒，蔓性種一畦栽二行，株距四十公分，一穴播種子三粒，播種法和豇豆一樣。發芽後，矮性種稍勻拔密苗，蔓性種每穴留二株。發芽後施糞尿二至三次，矮性種至結莢為止，蔓性種在第一次嫩莢收穫後再施一次。管理方法和豇豆相同，但矮性種不要支柱。播種後矮性種四十五至五十天開始收穫，蔓性種五十至六十天開始收穫。

· 作者近訊 ·

郁宗雄先生到橫斷公路中的梨山，視察蔬菜生育情形。七月廿六日下山的途中，為公路上滾石所傷。斗大的滾石直接擊中他的左小腿，石塊分裂為二，他也痛極倒地，臨時包紮後，要再走二小時才能搭上便車到東勢去治療。幸好郁先生是田徑運動的健將，肌肉結實，經檢查結果，骨頭並未損傷。郁先生已受美援機構推薦，到日本去考察蔬菜事業，預定本年九月一日成行。

二十二、菜豆(皇帝豆)

(1) 優良品種：①矮性種：福特虎 (Ford Hook)；②蔓性種：大花仁，臺南一號。

(2) 播種適期：中南部矮性種九至二月，蔓性種九至十一月，北部不適種。

(3) 栽培面積和種子用量：蔓性種利用園外空地，九月上旬栽十至二十株。搭水平棚架栽培，每株面積三平方公尺。預備種子三十至六十粒。

(4) 栽培要點：矮性種一畦栽二行，株距四十公分。蔓性種間隔三平方公尺栽一株，掘穴深澗各五十分公分，每穴施下堆肥六公斤，過磷酸鈣一百公分，草木灰一公斤，和穴土混和後播種。每次播種子三粒，平置，覆土厚一公分，上面再敷草木灰一把，促進發芽。萊豆耐乾力較強，怕過度潮濕，灌水應較少。成苗後間拔成每穴一至二株。棚架用竹或鐵絲搭成，引蔓上棚。上棚以前側芽全部摘除，保護頂牙生長。生育期稍施藥水，多施草木灰，注意蚜蟲。播種後三個月開始採收豆莢。莢形飽滿充實，莢色微變黃色時，是採收的適期。可一直收到六月。

二十三、菠菜

(1) 優良品種和播種適期：①本地種：北部九至十一月，中南部十至十一月。②日本種：ミンスタラント (Munsterland)，丸次郎北部九至十二月，中南部十至三月。③西洋種：ロマンナー (Viroflay)，各地十二月至三月播種。

(2) 栽培面積和種子用量：十月上旬、十月中旬、十二月中旬、一月上旬、二月上旬各播一畦。十二月中旬、一月中旬、一月下旬、二月中旬各間作一畦。每畦種子有刺種用七十五公分，無刺種(西洋種)用五十公分。間作時減半。

(3) 栽培要點：高溫期播種不發芽，十月後播種發芽良好。直播，用撒播法播種。播後覆土厚一公分，再稍鎮壓並敷草。發芽後，過密的地方陸續勻拔。生育期中注意灌水、除草、除蟲，不可乾燥。每七天施硫酸銨二百倍液肥一次，代替灌水。播種後本地種四十天開始收穫，外來種五十天開始收穫。陸續拔大株食用。

二十四、球莖甘藍(結頭菜、菜鶴)

(1) 優良品種：白燕 (White Vienna)。

(2) 播種適期：九至二月。

(3) 栽培面積和種子用量：十二月下旬播種育苗，一月下旬栽種一畦九十九株，需用種子四百粒(一·五公分)。

(4) 栽培要點：苗床育苗法和花椰菜相同。本圃一畦栽三行，株距三十公分，每行栽三十三株。栽培管理方法和花椰菜相同。栽種後五十天開始收穫。在珠莖變長，肉質變粗老以前，可陸續收穫。

二十五、萵苣

(1) 優良品種：

①刺葉種：快來刺 (Grand Rapids)，黑子

勤刺生 (Black Seeded Simpson)。

②卷心種：大湖系 (Great Lakes)，帝國系 (Imperial)，紐約系 (New York)。

(2) 播種適期：刺葉種十至三月，卷心

種十至一月。

(3) 栽培面積和種子用量：十月上旬播卷心種一次，至十月下旬栽一畦。十一月下旬播刺葉種一次，至十二月中旬栽一畦。每畦種子用量三百粒，育成苗一百株。

(4) 栽培要點：苗床育苗法和花椰菜相同。幼苗一至二片葉時假植一次，苗期二十五至三十天。本葉五片時定植到本圃，帶土移苗栽種。本圃一畦栽三行，株距三十公分。栽後注意澆水、施肥、中耕、除草、培土，不使土壤乾燥硬固。澆水用清淨水，禁用糞尿。用硫酸銨作追肥，活著後每十天施一次，共三次，每畦一次用量一百公分。刺葉種栽後三十至四十天開始採下部葉片，直至抽苔為止。卷心種栽後四十天開始結球充實成熟，整株採收。

(全文完)

農友們的好消息

民豐化工廠股份有限公司出品

地特靈濃乳劑 現貨供應

特長：能殺滅一切柑桔、防風林之天牛及甘蔗、香蕉和所有土蟻害蟲故為本省特產增產造林開墾等重要計劃不可缺少之特效殺蟲藥劑。

安特靈濃乳劑 近日應市

特長：對消除棉花之鈴蟲及水稻之螟蟲有特殊之功效。

本廠：一、本廠為臺灣省農林廳及糧食局美援農藥委託加工廠，加工成續各委託機關極為滿意。

簡介：二、除美援農藥加工外，本廠為應各地農民要求特由美國進口原料加工配製前述特效農藥。

三、本廠出品之農藥內含成份保證絕對與美援農藥相同並得由主管機關隨時抽查檢驗。

歡迎批發零售
公司地址：臺北市長安西路二八九號
電話：四一一九 五五七
工廠地址：嘉義市信義路一三七號