

「石頭豬」應淘汰

問：我家中養有四頭肉豚，其中二頭是俗說的「石頭豬」飼養不大。請問有什麼治療法？（雲林縣二崙鄉廖心忠）

答：豬隻長不大的原因，可能是先天的遺傳不好，生長慢，也可能是受疾病影響。但在你同一的飼養管理情況下，這兩頭長不大的豬隻，種的不良可能性較大。種不好，是無法治療的。像你所說的「石頭豬」，飼養很不合經濟，應予淘汰。（李登元）

母豬子宮脫出的預防

問：為預防母豬子宮脫出，飼料方面應注意那些事情？（陳瑞海）

答：母豬子宮脫出，多半是先天的原因。平時飼養管理上應注意的事項如下：不要使豬隻常有便秘（應）情形，飼料中應加麸皮約百分之十（因麸皮有鬆腸胃之作用並略有驅瀉之作用），同時應充分給青飼料，如甘藷葉、青菜葉等多汁飼料。（李登元）

肉用雞飼養問題

問：我想大規模飼養肉用雞請問：①用來杭母雞及芦花、紐漢西、洛島紅等公雞，如何配合才能得到理想的肉用雞種？②自出生至成雞，各需時日多少？③如按現在市面的飼料價格，每種雞自出生至成雞，各需多少飼料費？（桃園鎮蔡烈陽）

答：①經營肉用雞事業，以蘆花，紐漢西或洛島紅各品種互相雜交，或上述品種公雞與本地母雞交配產生一代均可，但不宜以來杭為肉用雞之用。②肉用種以童子雞之經營最為經濟，童子雞約須時三—四個月。如果飼養成雞則至少須十個月，但不經

③以童子雞三四個月而言，體重平均約達兩臺斤，每隻須混合飼料約為十臺斤，每臺斤混合飼料以壹元八角計，每隻須飼料費用計約十八元。若以成雞十個月計算則約需飼料三五臺斤（每隻），飼料費成本就要六三元，十個月什種雞之體重平均約為四臺斤半，照這樣看來，養成雞是不大合算。（李登元）

雜草養雞的參考資料

問：證明什麼地方有雜草養雞的資料？（雲林縣二崙鄉陳義明）

答：關於日本雜草養雞的方法，在日本雜誌『雞の研究』介紹頗詳，該雜誌在臺北衡陽街三省書店有代售，可直接與該店函洽。（李登元）

豌豆含有蛋白質

問：現在大豆餅很貴，可以用豌豆（番仔豆）代替嗎？（嘉義縣新港鄉洪恭利）

答：豌豆含粗蛋白質二—至二五%，可以用為植物性蛋白質補充飼料，但不能完全代替，大豆餅的粗蛋白質含量量約為四〇%。（李登元）

牡蠣壳的效用

問：用牡蠣壳粉養禽畜，有什麼營養價值？（嘉義縣溪口鄉陳天）

答：牡蠣壳粉主要成分為石灰質，可供給禽畜的骨骼生長，雞的蛋殼形成，及胎兒的生長。（黃立羣）

胡麻餅是良好飼料

問：胡麻餅可否代替豆餅做為養豬飼料（彰化縣永清鄉張福生）

答：胡麻餅含有三八·五%的蛋白質，一五·三%的脂肪，營養價值與大豆餅略相等，為良好之肥育飼料。（鄭謀平）

豬瘟注射後的反應

問：我家養幾隻克夏小豬，豬瘟預防注射後，有不良反應，後來，經過獸醫治療，恢復正常，可是食欲不振，有什麼補救的方法？（臺南縣白河鎮賴俊吉）

答：這種食慾不振是暫時的現象，再過一些時就會好的。現在可給一點健胃劑，促進豬的食慾，這樣可以恢復得快一點。（黃立羣）

產卵前的牛蛙餌料



問：產卵前的牛蛙餌料應怎樣給與？（嘉義市陳柏年）

答：產卵期以前的牛蛙每日給餌量，以牛蛙體重之百分之四為標準。即一公斤餌料可飼養二十五公斤的牛蛙。但是實際給餌量要視季節（天氣）增減，普通視前日所給餌料有無過多而增減。至於產卵期中（即發生啼聲以後之成蛙），是不吃餌料的，所以無須給與餌料。（曾梅池）

殺鼠靈大量調製法

問：殺鼠靈如要大量調製分配給農友們使用時，如何調製較為方便？（臺南縣永康鄉李朝進）

答：要集中大量調製分配農友們應用時，可採用攪拌器混和（見圖）。事先把每次混和所需的糯米，花生油



(右) 圖面剖筒機和 (左) 器拌攪

綠豆米豆種子的保藏

問：請問綠豆米豆種子的保藏法？（嘉義縣新港鄉林坤良）

答：綠豆和米豆的貯藏，必須保持乾燥，既保持乾燥，就可以減少蟲害的損失，所以種子採收後須充分曬乾，等到餘熱散盡，再盛入容器內密封，或加乾燥劑後密封，放在通風、乾燥、低溫的地方，防止日光直射。（請參考歷年第六卷第十八期「大豆新種」內，三，收穫與採種）。綠豆和米豆貯藏期間，為防止害蟲的蛀食，可利用保粒寧粉與豆類在一比五〇〇至八〇〇之比例拌勻貯藏，或於貯藏前用二硫化碳燻蒸種子，

蓬萊的優良種子！

贈送：「葉深早生甘藍」每農友限十公分八月底為止（本月可播種最好品種）

- △各種優良農藥大量廉價供應
- ※日製噴霧器、零件齊備
- ◎長岡交配一號甘藍◎海谷三池中生甘藍
- ◎美國白甘藍◎金澤粗蘭結頭菜
- ◎長岡交配二號白菜◎芝四不結球白菜
- ◎喜樹中生花椰菜◎包心大芥菜
- ◎加州大甜椒◎羊角辣椒
- ◎六十日早菜頭◎美濃早生蘿蔔
- ◎派遜蕃茄◎浮浦中生包心白菜
- ◎夏光蕃茄◎美國紅心五寸胡蘿蔔

「請用」 蓬萊農產行 郵政劃撥儲金八〇三號 電話四六七三二號 臺北市永昌街二號