



種菇成功談經驗

蕭日騫 (南投縣埔里鎮)

兩年前我被派往美國實習，回來時曾帶回美國及日本洋菇種，試種的結果成績都很好。

每坪栽培床所用的堆肥配合材料如下：

例一：稻草一五〇臺斤，牛糞五十臺斤，硫酸銨一·五至二·〇臺斤，氫氧化鈣一·五至二·〇臺斤，過磷酸鈣二·〇至二·五臺斤，水三〇〇至三五〇臺斤。

例二：稻草一五〇臺斤，牛或豬鷄鴨廐肥五十臺斤，硫酸銨一·五至二·〇臺斤，尿素〇·五至〇·八臺斤，過磷酸鈣二·〇至二·五臺斤，碳酸鈣二·〇至二·五臺斤，水二五〇至三〇〇臺斤。

例三：稻草二〇〇臺斤，硫酸銨二·五至三·〇臺斤，尿素一·〇至一·五臺斤，過磷酸鈣二·五至三·〇臺斤，碳酸鈣二·五至三·〇臺斤，水三五〇至四〇〇臺斤。

醱酵完了的堆肥放進栽培床，床厚以五至六寸深為適度，四寸以下的就不能得到豐收。

播種後經一個月至一個半月就可收穫。收穫總重量每坪普通為三十至四十臺斤，最好的可達六十臺斤，採收期間二至三個月不等，但總收量並沒有顯著的差異。

李皆得 (雲林縣口湖鄉)

中秋節過後，每坪地準備二百臺斤稻草，浸入豬糞尿中，做成廐肥一星期後，



不久以前在豐年看到一篇報導，就是省農業試驗所胡開仁技正所發表的草菇栽培。看後甚覺興趣，於是隨即向臺北農業資材公司購買菌種，按照豐年的方法（第六卷第十四期第八頁）開始培養，栽培中並不斷的寫信向農試所胡技正請教培養上的各項問題，經過廿幾天光景，所待望的草菇竟長出來了；每日採收二次，一坪地每日產量約一至二臺斤，當時喜悅的心情，無異是中了愛國獎券似的。



李顯宗 (雲林縣大埤鄉)

不久以前在豐年

播種後一個月零八天，床上長出小菇，再過一星期開始採收，共採收六十天，每坪地收穫二十公斤左右。

塊根收量最低，而鮮莖葉收量最高。）

臺灣耕作制度複雜，與其說種植適期，不如說適宜與何種作物輪作。按三個新品種的特性看來，七、八月間作花生的後作，或八、九月間作幽稻等作物的後作為宜。

糊仔栽培或冬季水田裏作栽培，因種植過晚，且已到旱季，均不適宜。

(4) 種植方法 最好用水平淺插法，而不要用斜插法。

插植時期早，雨期未完，土壤不過乾，水平淺插容易成活，而且，這三個紅心新品種節間距離短，節數多，插入土中的節數也多，每節與畦頂的距離都相等，每節受畦上的光照濕度也相同，每節着生甘藷的大小相同，個數多，產量當然比斜插的高。

(5) 翻蔓 這三個紅心新品種，都是短蔓品種，不需要常常翻蔓。

假如土壤過肥過濕，生育旺盛時，最多翻一次至二次。灌溉後三、四天也須翻蔓。

(6) 灌溉 生育中期，於十月至十一月間天氣過乾時，如果適度灌溉一次，產量可增加二至三成。

(7) 蒔苗選擇 蒔苗應當選用生長旺盛，一尺左右的先端八節苗。

中部苗及基部苗都不好。發根苗更不好，絕不可用。

啟事

「病蟲害便覽」出版後，農友紛紛來信購買，其中有少數農友把一元六角郵票貼在信封上，以致被郵局蓋上了郵戳，這樣農復會是不收不到郵票的。但是，為不使這些農友失望，書還是照發了。希望以後來信的農友注意：一元六角郵票一定要放在信封內。該書的購買法，請參閱本刊七卷十六期。