

麻的栽培管理，就可獲得增產的效果。

(1) 單作 苧麻栽種後可連續收穫八至十年，但山胞多於杉木幼苗間作苧麻，三、四年後即廢耕掘起。間作對苧麻及樹苗生育均有影響，山地栽種苧麻，應改為單作。

(2) 密度 栽培密度，行距應改為六十公分，株距五十公分。

(3) 補植 栽種初年應注意缺株補植，補植方法可用前面所說的隣株壓條法。

(4) 蓋草 冬季苧麻收穫後，山地氣溫很寒冷，為防霜害及旱害，宜在初冬(十一月)蓋草；山地可用玉米莖幹、花生蔓或茅草等覆蓋，每公頃約需一萬公斤。

(5) 整苗 新種或更新麻園，幼苗萌芽後，苗高十五公分左右時，齊地面刈割一次，以促進麻株生育壯健，分蘖增多。舊麻園於每年春天(三月

或五月)，齊地面刈割整苗一次，把麻幹覆蓋於麻株上。

(6) 灌排水 平地栽培苧麻，如灌溉便利，早期應適當的灌水，促進苧麻生育。雨季應注意麻園排水，以免麻株腐爛。


雨後或灌水後，施用化學肥料，對麻株生長很有功效。

四、適時收穫

目前，在南部屏東產區，第一、二期收穫的麻供製漁具，麻價高，常有提早至五十天即行收穫的情形，這時麻纖維色澤雖青白，但產量低。苗栗等產區，收穫期剛好是農忙，不易請到製麻工，收穫期常延遲九十至一〇〇天，不但麻纖維粗剛，而且全年收穫期數減少，產量減低。

適時收穫苧麻，當苧麻①下部葉凋落葉柄一部

分轉黃色，②莖部一半轉褐色，③節間開花結實，④莖中間折斷，木質部與韌皮部容易分離時，應於二至三週內，迅速收穫。收穫時要用銳利鐮刀，齊地平刈，不可刈高，影響苧麻生育。收穫時應配合製麻人工，選購天收穫。雨天收穫，麻株易腐爛，纖維品質變劣。收穫後應當天剝麻，若放置一天以後就難剝麻，纖維品質變劣。



法新更揮杆

臺南棉麻試驗分所試用剝皮機製麻，每臺剝皮

(下接十九頁)



使用農藥要萬分小心！

王鼎定

臺南、屏東兩縣，最近連續發生使用「富粒多」、

「PM」中毒死亡的不幸事件。

本省引進「富粒多」、「PM」等農藥後，農友們都能接受指導，小心的使用，有效地防治了水稻三化螟蟲

，也很少發生中毒情形。但是使用日久以後，農友們對這些毒藥慢慢地大膽了起來，忘記應該注意的事項，最近發生的中毒死亡事件，就是由於使用不適當而引起的。下面提出大家容易疏忽的幾點，希望農友們多加注意，避免不應該有的犧牲。

(1) 要照規定配藥 照規定配成的藥液，看來和水沒有什麼不同，因此有很多農友不相信這藥液會毒死人，甚至不相信能殺死螟蟲，因而隨意增加藥液的濃度。照規定，防治水稻螟蟲的「富粒多」濃度應為加水二、〇〇

〇倍，而農友們常只加水一、〇〇〇倍。用這高濃度的藥液，人當然更容易中毒。希望農友們千萬不可犯這種錯誤。請記住：藥液濃度一定要照規定的比例調配，絕不可任意提高。

(2) 要穿保護衣鞋戴手套 很多農友拿藥、調藥時不戴手套，屏東有許多農友還赤膊在田間噴藥，有的甚至用手來調合乳劑，這是多麼危險的事啊！

(3) 後退噴藥 有些農友向前走噴藥，就是向噴過藥的地方走去，這等於走向死路。請注意：一定要後退噴藥。

(4) 工作時間不可過長 農友們常整天不停地在田間噴射藥劑，這是千萬要避免的。噴射有毒的殺蟲劑，每天至多只能操作四小時，絕不可超過時間工作。