



川陳登言

我的父母都是由美國到本省來的。血統、體型、能力、都是最優秀的盤克夏種豬。我有四個兄弟、五個姊妹；我是第五胎次出生，在二個月哺乳期間，主人常加給甘藷藤、青菜類、豆餅、脫脂奶粉及礦物鹽類（骨粉、炭酸鈣、食鹽）等給我們吃，並且每日都使我們在運動場充分運動遊玩，所以我們的健康發育情形都非常好。第七十天左右，獸醫給我們打了一針豬瘟疫苗，又過數天，吃了三、四次的除蟲藥，排出許多蛔蟲。當時我感覺非常舒適。以後約有半年以上的免疫期，不會感染瘟疫，同時腸裏亦沒有蛔蟲。又過了十數天（約八十餘天），主人將我兄弟們分別推廣到各個農村；我們兄弟姊妹們，在這八十餘天內一起過着快樂的生活，一旦要分離是多麼的難過啊！當我到了

新主人家的那天晚上，女主人就拿來一小桶飼料，放在槽裏，我走近一看，天哪！槽裏都是水，一塊一塊的飼料太少。叫我怎能吃得飽啊！一星期後，飼料裏稍為增加了些甘藷、殘飯等，但仍是吃不飽，並且還是時斷時續的，叫我如何成長呢！住在這又髒又暗的房子裏，從沒有到外面去作過運動，晒過太陽，我的體重原有二十五公斤，現在却已瘦了三公斤。

有一天，鄉公所的獸醫來看我，我對這位獸醫存有莫大的希望！只聽得他對我的主人說：

（一）你的豬房又狹又髒，而且沒有運動場設備，不能使他健康。（二）你給牠的青飼料太少。（青飼料內有豬發育上需要的維生素）。（三）你的飼料中水分太多；同時沒有豆餅的配合；豆餅蛋白質含量高，是發育上必須要的養分；乾物質量亦不够。（四）要加上點礦物鹽類，例如骨粉三份與食鹽一份配合，每天給與十到十五公分。（五）如照上述配合飼養及管理，牠的發育就快且健康，到十個月體重達一百公斤時，若有發情現象，即可配種。

經過這位獸醫指示後，主人在飼料上，只增加了些甘藷粕等澱粉質飼料，因此我的發育還是太慢。

四個月後（年齡約七個月）的一天。我的外陰部稍有增大變紅的現象，這只是預備發情。可是主人看到了就趕快叫來一隻很大的種公豬和我交配；因為我的內部生殖器官還未成熟，所以我不願意接受，只是跑來跑去的掙扎着。

經過二、三次發情後，我的內部生殖器已近於成熟，這時我的年齡已到十個月，但體重只有八十公斤（標準為一百公斤）。這次發情，我有些願意和種公豬交配了；但是這一次我不會受胎，因為主人平時對我的飼養管理太不

臭物有毒食會死

王西圖文



苦味臭着嗅，見看來嫌張壁隔③便雖件物爛腐，（他勸）伊勸？（必何）昨卜是毒中了食，宜

臭堆一見看，市菜去李老日一⑤緊趕，宜便真在貴錢價，魚爛去返買（它將

刻人做，（妻夫老）婆任二李老州溪①呵會儉勤（又）再閑，勞耐（和）甲苦。對不好嘛真宜便買愛，（敬可）老

好了。他並沒有依照獸醫的吩咐照顧我，以致我健康情形不好；又因營養不良及礦物鹽類的不足，以致繁殖能力低下。數日後聽到主人對太太說：「我在街上碰到鄉公所那位獸醫，他再三囑咐我對這隻母豬要好好飼養，好好管理，不然的話一定得不償失。」因此主人不久就買來一角豆餅（一塊的四分之一），一小包骨粉，每一次只在飼料裏好像加調味料似的加上很少的量，但總比沒有好。所以再經過二次的發情，我的體重、生殖器、已經達到完全成熟期。經主人又設法配種一次，我就受胎了。

配種後經過二十一天，我再沒有發情，主人知道我已經懷孕，很是高興；但是給我的飼料却仍然依舊。我受胎後需要許多的養料，在前半期（即在懷孕二個月間）須要甘藷、麸皮、米糠、豆餅、青飼料，及礦物鹽類（日量二〇—二五公分）等，且日常要有充分的運動和晒太陽，才能保護胎兒的正常發育與健康。在後半期（即懷孕二個月後至分娩期），因為胎兒發育

加快，我需要更多的養分，但是我的主人對我需要的飼料，每日都未能供給我。自懷孕以來仍舊是澱粉質飼料及太多的水分；所以我和胎兒最需要的蛋白質飼料（如豆類、豆餅、魚粉等），礦物質飼料（如骨粉、貝粉、炭酸鈣、食鹽等）及維他命類（如青菜類、甘藷藤等）都很缺乏。因此胎兒在發育上需要的養分，只得從我自己平常蓄積的養分中吸取。

我懷孕後第一一六日的今天早上，身體已感覺不舒服。常常起來放尿排糞；肚裏微痛（初陣痛）；過了數小時後，增加陣痛，主人看我非常不安，就給我許多稻草，使我安靜。不久，我在痛苦之間已生下八隻小孩子（其中二隻因發育不完全當即死去），一小時後胎盤也全部流下了。這時候我本身已非常衰弱，且在懷孕期中骨髓中的骨分（磷酸鈣），大部份讓給胎兒使用。因此體內養分消耗太多。四肢已經軟弱無力，不能支持自己的身體。


（未完，下期續）

肥料名	總用量	基肥用量	副基肥用量							
			第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次
堆肥	三〇〇	一〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一
硫酸銨	一〇〇	一〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一
過磷酸鈣	一〇〇	一〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一
木灰	一〇〇	一〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一
草木灰	一〇〇	一〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一
硫酸鉀	一〇〇	一〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一
堆肥	一〇〇	一〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一
硫酸銨	一〇〇	一〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一
過磷酸鈣	一〇〇	一〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一
木灰	一〇〇	一〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一
草木灰	一〇〇	一〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一

（上接第十二頁）「西瓜的整地播種與施肥」

堆肥要用腐熟細碎的。副基肥應在播種後立即配合貯存備用；第一次在抽蔓前施於植穴內之半邊，第二次在植穴內之半邊，第三次在植穴內之半邊，第四次在第一次副基肥後十日施於相反

的半邊，深入穴面二公分，施下後覆土。副基肥施用不可太遲。施追肥次數在壤土可減為六次。八次追肥的施用時間如下：第一次在本葉二片開展時，第二次在本葉四至五片開展時、第三次在抽蔓時，第四次在蔓長五十公分時，第五次在第一雌花開花時，第六次在幼果拇指大時，第七次在果如拳大時，第八次在果大二十公分直徑時（即成熟前十五日）。追肥都施在植穴內。



理明有了聽李老，死會食毒有物臭⁽⁶⁾，（要可不）治通嘔魚臭（妻）某叫。宜便貪取（不）嘔此從



食子因，（事無）志代無少食仔義⁽⁵⁾年小薄力抗抵，止（不）飴鴉了。（救無）醫無已來請生醫，紀



通（再）閭（們他和）因共憲張⁽⁴⁾肉臭宜便，義仔王村前年舊，知死險惡毒中妻夫，去返買