

番茄莖枝法那種好？

問：番茄用「双幹整株」及「單幹整株」，那種收量較高。(屏東縣坑頂鄉王天送)

答：小果種(如 Best of all 或 Sun-merset 等)宜用双幹整株法，大果種(如 Ponderosa, Stone Break, O' day, Prichard 等)應用單幹整株栽培較理想。(陳文郁)

番茄種子可用藥劑消毒

問：番茄種子，採種晒乾後隔二至三天就播種，對產量及病害發生，有沒有影響？(屏東縣坑頂鄉王天送)

答：對產量及病害沒有影響。但有病害時，播種前宜用「好辣殺」或「斯巴根」拌種藥劑拌種消毒。(陳文郁)

水稻穗頭為何不稔實？

問：我的水稻穗頭都有四、五粒綠色不稔實，是什麼原因？(嘉義市維生金生)

答：穗頭數粒不稔實，有下列兩種原因

- 最可靠優良種子**
- ◎長岡交配一號甘藍 (原封罐裝)
 - ◎長岡交配二號白菜 (原封罐裝)
 - ◎美國紅心五寸胡蘿蔔 (原封罐裝)
 - ◎海谷三池中生甘藍 ◎美國包心高苜
 - ◎京都三號結球白菜 ◎美國嫩莖高苜
 - ◎金澤粗蘭結頭菜 ◎美國改良中生花椰菜
 - ◎美濃早生蘿蔔 ◎美國晚生花椰菜
 - ◎包心大芥菜 ◎派遜蕃茄
 - ◎潮洋甘瓜 ◎夏花蕃茄
 - ◎大梅花蘿蔔 ◎廣東大格蘭菜
 - ◎芝菜結球白菜 ◎福壽晚生花椰菜
 - △各國優良農藥大量廉價供應
 - ※噴霧器零件齊備 「目錄備索」
- 臺北市永昌街二號(永樂市場角)
蓬萊農產行
郵政劃撥儲金八八三三號
電話 四六七三二號

①大穗品種常有這種現象。
②出穗前約二至三天，恰逢強風，在葉鞘內摩擦結果，花蕊傷害，出穗後十天雖是青色，以後會變白色。(余慶東)

使用豬驅蟲藥要小心

問：我家飼有在來種豬三頭，其中一頭生長較慢，據說「阿司卡利肯」可以驅除豬蛔蟲，但經使用後五小時左右，小豬吐瀉(帶血)，不久就死亡。請問這是什麼原因？(花蓮縣光復鄉黃福源)

答：「阿司卡利肯」主要成分為氟化鉀，確實能驅除豬蛔蟲，這是從日本進口的。現在本省也有製造驅蟲藥，名字叫做「肥豬除蟲藥」。因氟化鉀有毒，如溶于水而內服，則可能中毒，最好是用比較乾燥的給豬吃。你的豬吃藥後死亡，可能是中毒，也可能是投與時誤入氣管，也可能有其他病發生，要剖檢屍體方可明白。(黃立群)

矮性菜豆種子已賣完了

問：貴刊七卷十五期介紹的矮性菜豆(敏豆)，什麼地方有種子出售？(彰化縣鹿港鎮謝錫麟)

答：省農會本來有矮性菜豆種子三六〇公斤，現在已全部賣完，請待明年春天再向鳳山試驗所接洽。(陳文郁)

你想種年花韭菜嗎？

問：請問①年花韭菜種子何處有售？
②何種土壤適合栽培？
③普通要施什麼肥料？
④聽說年花韭菜有時候會枯萎，是什麼原因？(臺東鎮豐原里彭阿土)

答：①年花韭菜種子請向鳳山鎮果菜市場陳有財先生洽購。
②年花韭菜適於排水良好且灌水方便的肥沃砂質壤土栽培。
③應多施有機質肥料(堆肥、豬糞尿等)，且應多施草木灰等鉀肥。

金針花製乾有良法

問：我家種些金針花，晒乾後常變成黑色，很不好看。請問有什麼方法，使顏色與品質都好？(臺中縣新社鄉詹進通)

答：每日清晨採取含苞欲放的花蕾(花已經全開放者製成風味不佳)，浸於2%之食鹽水中約十分鐘，然後取出，用蒸氣蒸熱，在日中曬乾，即可成品質良好之乾金針菜。(陳文郁)

讀者服務

△純種阿薩姆茶苗二年生約二十四萬株，柳杉苗木一年生約三十萬株，廉價出售。(臺北縣三峽鎮插角里林進財)
△徵購矮雞，有過一次抱卵經驗的母雞，體重約一羣斤左右，小雞亦可，請函每羣斤價格。(雲林縣元長鄉龍岩村五二號吳金松)

殺菌藥

大生七十八 (DITHANE Z-78)



防治

- ①柑橘，葡萄，鳳梨等水果之銹病，赤衣病，萎凋病，黃油色斑點病與黑星病等特效。在美國福洛利達之柑橘水果農場，經十年試用，成效最佳。每年夏季一次噴散，獲得98%之成效。
- ②菸草之青霉病。
- ③番茄之夏疫病，晚疫病，炭疽病，葉斑病，葉霉病。

◎說明書函索附郵票四角即寄

羅門哈斯公司臺灣總代理 青象貿易有限公司

臺北市中正路1756號 電話：27467

零銷處：

- 臺北市中正路1756號
- 嘉義市中正路485號
- 鳳山鎮第二市場148號
- 新竹市中正路78號
- 臺中市繼光街
- 大壠農中 太原工業
- 食糧種大
- 種子苗藥房
- 行行店房

△希望參加養雞研究會者，請於十月底以前通知住址、姓名、養雞隻數、年數等。(臺北縣板橋鎮館前路國際畜產藥物廠)
△徵購海人草(日人曾用以驅逐蠅蟲者)，請函每公斤價格。(高雄縣六龜鄉老漢村一八六號陳漢川)