

有刺激性的，如生薑、胡椒或發芽的馬鈴薯等，不適餵兔。

配合飼料時，應注意下列事項：

(1) 餵兔的飼料必須多種混合，以免營養分不完全。

(2) 青草、乾草、樹葉、根莖等外，必須加添濃厚飼料來補助營養分的不足。

(3) 飼料須選擇價格便宜而富含營養分的，但同時要顧及家兔的嗜好。

(4) 如飼料富于營養分而味不美，可配入其他美味的飼料來調合。

(5) 普通家兔體重一公斤，每日約給飼料一百二十五公分(即生體重的八分之一)量最為合適；以七成青草類，三成濃厚飼料的混合比例為原則。

因季節的不同，飼料供給的種類及配合比例也不同。下面介紹三種配合實例，以供參考。(每頭每日餵給量，分晨、午、晚三次)

(一) 白色紐西蘭種兔

晨：青飼料一百五十公分(青草、甘藷蔓、甘藷等)。

午：豆腐渣一百公分。

晚：混合飼料五十公分(大麥四十五%，小麥四十五%，大豆餅十%)

(二) 家兔

晨：青草或菜類，以二小時左右可食完為度。

午：混合飼料(小麥、米糠、玉米、大豆餅等)

在半小時可食完之量。

晚：青草或菜類及混合飼料，至翌晨食完量。

(三) 家兔

晨：雜草一百五十公分。

午：混合飼料五十公分(四十%米糠，四十%甘藷，十%玉米，十%大豆餅)

晚：雜草一百公分，混合飼料五十公分。

給與飼料時，必需注意下列幾點：

(1) 嚴守飼料給與的時間。

(2) 飼料每日分二至三次給與；二次時分晨晚，三次可分晨午晚。在哺乳期中，分三至四次給與更好。

(3) 早晨多給粗飼料，晚多給濃厚飼料，每次給與量要一定。

(4) 如要變換飼料，必須慢慢改變。

(5) 飼料槽要常洗滌，在日光下曝曬，保持清潔。

怎樣鑑別仔兔雌雄？

仔兔的睪丸還沒有下垂，可以鑑別雌雄嗎？這裡告訴你奧妙的方法：

①陰部與肛門的距離大的是公兔，小的是母兔。②陰部左右，稍向上方的皮膚，公兔的很柔軟(有皺皮，有點像火傷的部分，就是將來陰囊的部位，請看上圖之3)。③用左手捉住兔子兩耳，並托其背

，使仔兔仰臥在手掌中，用右手大拇指及食指，翻轉陰部，檢查排尿孔，如果是圓形排尿孔，就是公兔；母兔的排尿孔是橢圓形的(上圖之1)。④陰部稍前方，有一對乳白色圓形物的是公兔。(上圖說明

：1 排尿孔，2 肛門，3 未來之陰囊部，4 乳白色圓點。)

與農種子行

- 甘藍：長岡交配一號、三池中生甘藍
- 結球白菜：京都三號、長岡交配二號
- 萵苣類：(美國直輸入原種)
- 其他品種甚多請向敝行照會訂購
- 洋菇種菌 現貨供應
- カスミ網 (ナイロン製、巾五間二棚)
- 臺北縣三電鎮重新路一段四八號

蔬菜栽培之良伴

興農園藝新智識

(無償贈閱四健會會員，其他請附郵票二元函索即寄)

●胡蘿蔔(美國原封罐裝)：

美國大五寸、紅心五寸、甜嫩七寸、新長橙人參、中長人參、丹佛中長人參

●蕃茄(美國直輸入原種)：

紅櫻花、朱比利、馬格羅、普立查、大型彭大蘭紗、皮亞遜、石通、プレーコデー

●蘿蔔：大梅花、美濃早生

●興農晚生巨大花椰菜(晚生花椰菜之最優良種)

