

(二) 培土：生長點着生小花蕾時，為培土最適期。如開花後就不宜培土了。低濕地、畑地宜淺栽，隨其生長須做二、三次培土。培土時追肥應在萌芽期施用，始能提高肥效。

(三) 防治病蟲害：防治萎縮病、輪腐病，除選用健全種薯，施行消毒外，尚無其他妥當方法。濕潤氣候，有疾病蔓延可能時，必須撒布四斗式，六斗式波爾多液；銅製劑；或大生等藥劑預防發生。開花期、盛期、終期的三次撒布最有效果。

偽瓢蟲喜食葉部，為害最甚，在成蟲產卵期撒布砒酸鉛，可防止產卵。蚜蟲、夜盜蟲、雞母蟲等可撒布BHC、DDT、砒酸鉛等防除。

摘芽 每株莖數以三至五莖最理想，莖多將着生多數小薯，莖少則薯大數少。

摘花 摘花所需時間及勞力甚多，不合經濟，故不需施行。

收穫 莖葉黃化，開始凋枯時，為收穫適期，過早過遲，均不相宜。

防腐貯藏 擇晴天採收，晒半天陽光後貯藏，對防治疫病有效。除去罹病薯後，將消石灰或西藥生石灰撒混貯藏，使用量為貯藏重量的二%。板箱包裝能耐長期貯藏，草袋裝不宜堆積太高。

一隻母猪的自述

陳登訓

(續上期)

主人見我站不起來，食慾不振，於是再去鄉公所請獸醫來醫治我。經過獸醫詳細診察後，說是平常飼養管理失當所致，於是主人的飼料才稍稍改善。我雖然稍見起色，但未能復元。因為我的六個孩子在一天裏要吃二十多次的乳汁，而飼料中的營養却不够我和孩子們的吸收，致使孩子無法發育生長。十數日後，我又倒下不能站起了。於是我伏在地上哀告我的主人說：「假使你早就照獸醫的話飼養我，給我充分的運動，和足夠的營養，就不致影響我的健康，繁殖力，和胎兒的發育。」

「您要使我配種時，應在生後十個月體重一〇〇公斤時，配種的適期，是在我發情開始算起十到二十五小時裏。此時交配，受胎率可

達一〇〇%。生產隻數亦多。」

「飼料裏礦物鹽類不够時，胎兒的發育生長不完全。而您不另給我礦物鹽類（骨粉二份，貝粉一份和一份食鹽的混合物。且在懷孕後半期及哺乳中須增加數量。）如日量每天二五到三〇公分，胎兒的骨骼須要的磷酸鈣分，只有由我的骨髓中取出來應用了。因此使我骨骼軟弱，後軀麻痺，而不能起立；現在我的體重只剩下五〇公斤了。我已不是一隻好母猪了。」

於是主人將我出售給商人，他將要把我屠宰了。我本來是一隻好母猪，因為主人對我的飼養管理技術不清楚，枉費了我的一生；我的血統；我的體型；我的優秀能力；我的後代。唉！我的一切都被主人葬送了！（完）



有，（信可不）信通嘸話的命算⑥
人做茹蕙，緊要（最）上醫求病
身自害（夫）厄害子害，真天！



明不信迷在實，去乞求子帶茹蕙⑥
饑狀受（食得不）食通無求，理
。死病子（淋）滿雨吹風，



伊叫，字八排（他給）伊共命算④
，去乞求子母好最，離分暫妻夫
。除病百災消乞求