

紫雲英是好綠肥

達利林 鎮林樹縣北臺



我栽培紫雲英有二年的經驗。紫雲英是一種豆科作物，栽培容易，每公頃所產莖葉可供二公頃水田做綠肥用，比過去栽培的大菜、青皮豆，都要有利的多。下面介紹我栽培紫雲英的方法，給有興趣的農友做參考。

播種前的準備 選擇灌溉方便，排水良好的田區，種植不易倒伏的蓬萊種稻，並要正條種植。

播種適期 第二期水稻收穫前約二十天，以糊籽播種；如果延遲到水稻收穫後播種，就沒有水稻可保護幼芽的生長。

綠肥用的用撒播，採種用的用條播。條播時，每隔二行水稻種植一行紫雲英。播種量，撒播的每公頃二十五公斤，條播的十二公斤，不可節省種子疏播。

播種的要訣 播種前一天，全田灌溉後排去田中積水，拿種子一公斤和接種用土壤二十公斤，加上一兩倍的火燒土糞及草木灰，充分混合後，均勻撒佈在水田裡。播種時不可混合化學肥料為基肥，以免傷害幼芽。

肥培管理要點 播種後如乾燥，需常灌水。下雨時要注意排水。紫雲英生長期間，原則上不施任何肥料，但在水稻收穫稻草搬去後，全田引水灌溉，再立即排水，於土壤濕潤時，可施一次肥料，每公頃用硫酸銨八十至一百公斤。採種用的，在生長期間應多施草木灰，幫助結實。

採種 採種用紫雲英最好在上午九時前莢果還濕潤時

採收，這時採收可以避免種子脫落。全部刈取莖葉運到晒場，約晒三至五天就會全部乾燥。


乾燥後用槌打壓，用篩除去夾雜物，再用風鼓扇淨，就可收得乾淨的種子。種子再晒二至

三天，就可以貯藏。



友農達利林

本行運到下列農藥，都是美國名廠出品，効力確實，歡迎選購。



防治為害果樹的果蠅請用：

(1) 果蠅毒餌噴霧劑

(Staley Protein Insecticide Bait No. 7)

(2) 果蠅誘殺劑 (Methyl Eugenol)

防治尺蠖蛾幼蟲、蚜蟲、螞蟥、介殼蟲等害蟲


請用 蟲停足

(TREE TANGLEFOOT)



防治果樹蔬菜棉花病害，請用
好速殺水和性粉劑 (含有蓋撲丹50%)

(ORTHOCIDE 50 Wettable)



臺中市民權路57號

正豐農藥行