

乳液(木瓜酵素)凝集所致，對木瓜生長並無妨礙。(戴邦本)

### 田菁莖葉不宜做養豬飼料


問：田菁種子及田菁莖葉，要怎樣處理才可供作豬飼料？(臺南縣佳里鎮莊秋郎)  
答：田菁種子約加五倍水，在鍋中煮約一小時，濾起種子，用水洗滌二、三次，即可餵豬。如果為保存便利起見，可將處理過的種子晒乾或烘乾貯藏。田菁莖葉，不宜做養豬飼料。(黃立群)

### 花椰菜有那些優良品種？

問：請問在做地栽培花椰菜，早生、中生、晚生，各有那幾種優良品種，種子那裡有出售？(新竹縣芎林鄉林保璋)  
答：鳳山極早生、鳳山早生、鳳山中生、喜樹中生、鹽水晚生，都是現在本省花椰菜中的優良品種。種子在鳳山鎮第二市場一四八號農友種苗店有售。(陳文郁)

### 讀者服務

△徵購十七號甘藷，數量無限，請函每畝斤價格。(嘉義縣大脚鄉正義村中壽一七號侯源五)  
△廉讓：①抽水機(三吋口徑)及鐵管，八成新。②鳳梨苗。(臺中縣大里鄉健民村六七號陳金枝)  
△出讓：①油桐苗木，高三、四尺左右，數十萬株，每株二角。②水梨苗木，高四、五呎尺，三千株，每株五元。(新竹縣芎林鄉石潭村二〇號之一羅友來)  
△出售偽玉種成苗。(嘉義縣六脚鄉蒜頭村一六九號呂源洲)  
△出售優良苗木：紅肉李苗五千株。紅梅苗八千株(二、四呎尺高)。正酸橘苗三萬株(一年生，一、二呎尺高，苗木用)。檸檬酸苗五萬株。大荔枝五萬株(一、五呎尺高)。安南漆苗二千株(高一、二呎尺以上)。(新竹縣新埔鎮中正路二五八號劉仁丹)



照片係荔枝結實盛茂時  
各界人士來園參觀情況

### 保證書

鄙人經營園林正為推廣苗木，自先伯父起在頭家居經營出售苗木之苗木，歷經百餘年，蒙各方顧客諸君之愛護，無任感荷。奈近來間有不法業者，將不正之苗木，混雜於苗木中，以假亂真，致使顧客受損，且使顧客安心訂購起見，特具保證書如左：若有人不經本園同意，私自將苗木出售，或將苗木混雜於苗木中，一經查出，自保其損失之賠償，恐口無憑，特此保證書為證。

先生

中華民國 年 月 日  
林旭 啟

### 關刀豆處理後才可食用

#### ——慶文劉——

關刀豆可大別為赤色種和白色種兩種，本省栽培的大多是白色種。  
用途：刀豆種實(含蛋白質二〇%)可供煮食及製豆沙餡與糕餅原料。未成熟的豆莢，可供煮食及製泡菜或醬菜(漬物)等。刀豆的種實含有多量(九·七%)的纖維，吃下後會影響消化與吸收，同時含有單寧等事物，吃下後會發生麻痺、嘔吐等，因此，必須經過如下的處理，才可食用：刀豆種實加五倍水，煮至種皮裂開，瀝起後脫去種皮，再用水洗淨，即可應用。未成熟的豆莢，必須浸水(石灰水)或加水煮沸二十分鐘，瀝起後再以水洗淨，即可應用。  
栽培方法：刀豆不甚選擇土宜，排水良好的土地均可栽培。播種期：本省北部和中部以二至四月為宜，南部和東部以十至十二月為宜。播種法：採用點播，每穴播種二粒。每公頃需種子七三至一三六公斤。畦幅六一至九一公分，株間四五公分。播種後土後再用草或稻草蓋，發芽前(發芽日數約十三天)除去遮蓋的草。每公頃施堆肥一萬二千至一萬八千公斤，過磷酸石灰二百公斤，草木灰八百公斤，全部作基肥施用。此外，人糞尿一萬九千公斤，用作追肥，分五次施用。刀豆的管理法與一般豆類相同。  
註：這是臺東縣卑南鄉鍾慶吉與高雄縣六龜鄉陳連進兩位農友來信的解答。



二尺 三尺 四尺 五尺 六尺 七尺 八尺 九尺 拾尺 拾伍  
尺高 上下 上下 上下 上下 上下 上下 上下 上下 上下

如直向本園訂購苗木時，請具保證書，數量多少，均保無誤。

臺中縣潭子鄉頭家園中山路十號

林永旭荔枝苗園