



怎樣撲滅菸草鑲嵌病

郭可詒

(菸草鑲嵌病病葉)

苦種植的菸草，一旦得了此病，產量大為減少，品質也變劣，等級一定屬於等外。下面告訴你的，預防這病害最可靠的辦法。只要你肯下決心去做，保證絕對有效。

一、苗期要注意些什麼？

- (1) 苗床不可設在舊菸田，要選用三年以上沒有種過菸的土地做苗床。
- (2) 苗床要遠離乾燥室及菜園。有許多蔬菜是鑲嵌病的寄主，馬鈴薯、番茄、茄子、辣椒、菜豆、菠菜、酸漿、蔓陀蘿、牽牛花、大理菊，以及許多瓜類及茄科植物等，都會患鑲嵌病，不但會傳播病害，而且也易發生害蟲。
- (3) 堆肥必須腐熟，絕對不可混有菸骨菸砂。
- (4) 苗床及苗床附近的野草，要儘量清除。
- (5) 菸草種子上附着的夾雜物，尤其是小菸葉屑，應儘可能的除淨。
- (6) 入田工作前後，各項用具、手指等，須用肥皂水洗淨。
- (7) 食害菸葉的咀嚼口器昆蟲，如尖頭蚱蟬等，應注意驅除，但不可用菸浸汁為驅蟲劑。

菸草鑲嵌病

病〔「狂」、或「反尾」〕很容易傳染，常用的藥劑都無法防治，辛辛苦苦

二、本圃的預防要領

- (8) 田間工作時，絕對禁止吸煙。因各種捲煙都免不了帶有毒素，吸煙人的手和丟棄的煙頭，都可傳播病害。
- (9) 苗床發現病害時，該苗床最好廢棄。如不得已時，應拔除病苗及其附近的菸苗。拔除時，從距病株較遠的苗先拔，並應留意不可使殘根碎土灑散。拔除的苗應集中在妥當的地方燒燬，切勿任意亂丟。病株不表現病徵的部份，一樣可以傳染，切不可忽視。
- (1) 要採用絕對可靠的菸苗。罹病苗床的苗，最好不用，至少病株附近的苗，絕不可使用。儘量避免用別人的苗。
- (2) 關於肥料，殺蟲劑，及工作前後農具、手指之洗滌，禁煙，野草清除等，應按照苗床預防方法切實做到。
- (3) 及時設置防風牆，以免葉面擦傷，增加傳染的機會。
- (4) 害蟲要隨時防除，蚜蟲更應徹底消滅。
- (5) 病株應拔除燒燬，拔除後不必補植，補植後還是會發病的。
- (6) 田間碎葉及腋芽等廢物，要隨時清除。
- (7) 不可引入發病菸田的水來灌溉。
- (8) 如後期病株太多，全部拔除損失太大，病株與健株可以分別管理。病株可樹一標識，等健株工作完畢後，再輪到病株工作。摘芯、除芽最易傳染，應特別注意。

(9) 收穫後，殘桿要連根翻起移出，拿回家中充做柴燒。

種菸的農友們，鑲嵌病一定要大家共同預防。這病很容易傳染，如只你一家注意預防，而鄰近的農友們不注意，你的菸田還是很難保持安全的。

◎洋蔥、馬鈴薯栽培者福音!!

洋蔥、馬鈴薯一切病害特效藥

裕米農 乳劑、錠劑、石灰
(日本北興出品)

美國、日本等優良蔬菜種子

貨真價廉、歡迎比價採購。

- | | |
|---------------|-----------|
| △美國紅心五寸人參 | △長岡交配一號甘藍 |
| △美國時無五寸人參 | △三地中生甘藍 |
| △美國豐肉六寸人參 | △マサゴ三季甘藍 |
| △美國長形紅心人參 | △金澤粗蘭結頭菜 |
| △大型晚生花椰菜 | △春蔴交配二號白菜 |
| △美國アスパラガス(蘆筍) | △野崎春蔴結球白菜 |
| △美國結球高苣 | △黑葉京都三號白菜 |
| △美國嫩莖高苣 | △美濃早生大根 |
| △美國露地香瓜 | △日本ニームロン |
| △美國ゴマゴロトマト | △日本白雪メロン |
- ◎其他各項蔬菜種子、農藥農具及各種食用種菌均有詳細參考目錄(附郵票一元函索即寄)

臺灣農產企業公司
臺灣農業資材公司

劃撥儲金一二七九九號
臺北市迪化街一段八六號