


如何預防 可怕的白痢病

李太君



雞白痢病是養雞事業中的一大障礙，現在既無特效藥可以治療，也沒有適當的預防針可注射，祇靠消毒、檢驗、淘汰病雞等，來預防病源傳播，由此可見此病預防工作的不易。據本省四十五年度各縣市政府檢驗結果，帶菌雞約五%左右，這是一個相當可觀的數字，若不澈底預防消滅，對本省養雞事業的發展，將是一大威脅。

雞白痢病的病源是一種細菌，母雞初患此病時，症狀並不明顯，後來產卵減少，或產畸形卵、下痢、有時會偶然發生敗血症而死。病雞的排泄物中含有病原細菌，會傳染給其他健康雞隻，而且所產的卵中也有此病原細菌存在，人類生食此卵可能有害健康。病母雞所產的種卵所孵化出來的雞，一定被卵中的病原細菌感染發病。病雞排出白色或微黃白色漿糊狀痢，沾粘在肛門四週，致排糞時發出尖叫聲。羽翼下垂，寒慄，双目合閉，呆立不動。孵化後第七天至第十天以內死亡最多，且在此十天內也會直接或間接地傳染給同羣其他健康雞。也有症狀輕的可能逃過死亡，但其體內仍帶有病原細菌。公雞若是帶菌者，則經交配可將病原傳染給健康母雞，再經種卵而至雞，如此循環地遺下病原，這就是使我們難以防治的原因。

我們應採取下述幾種方法來避免雞白痢的侵害：

一、購買雞及種卵時，應選擇檢驗合格的母雞所產的卵或雞，切勿向未經檢驗，或有病雞的養雞場購買。

二、病雞或帶菌雞沒有治療的價值，應立即撲殺，燒燬或深埋，並消毒，以免造成全數死亡。

三、雞應在孵化後第三十天至第七十天以內，時加檢驗，淘汰帶菌雞。

四、育雞箱應常常消毒。

五、公雞和母雞應於每年夏季前後及採種卵前各檢驗一次，以淘汰病雞。

六、孵卵器於每次孵化後均應消毒，方可再度使用。

上述預防檢驗工作，各縣政府家畜疾病診斷所，均可指導協助，願農友們注意預防這一種為害雞雞的可怕病症。

密醫害人無塊講



③張寶醫藥雖便宜，却是無牌的打針。伊（他）共阿毛注打。伊（他）共阿毛注打。伊（他）共阿毛注打。



②金阿厝（鄰居）老婆，伊講前。金阿厝（鄰居）老婆，伊講前。金阿厝（鄰居）老婆，伊講前。



①阿金年四十五，單一生是個查。阿金年四十五，單一生是個查。阿金年四十五，單一生是個查。

火皇文
壬酉圖