



農業信箱
件，請在信封上
寫「農問」二字
，以便本社收發
迅速處理。

公猪生殖器官什麼流血？

問：本鎮黃水仁農友之蘇克夏種公猪，小便或交配母猪時，生殖器官流血，請問該如何處理？（金門縣金沙鎮農會黃泰局）

答：公猪生殖器官流血，可能係血尿，其原因如腎臟出血，腎臟損傷，血液病，尿石或寄生蟲之關係。此種病如治療無效，不能作種猪用。（黃立章）

母猪停止發情可試用荷爾蒙

問：本鎮張潤海農友之母猪已懷有數年，在過去數年中，生長良好，生產也正常，但不知何故本年初突然停止發情，不過，母猪健康情形還是很好。（金門縣金沙鎮農會黃泰局）

答：母猪在過去曾生產，最近突然不發情，可能是卵巢有病，或卵巢水腫。在外表看來是非常健康的，甚至較過去還要肥一點。可試用卵巢荷爾蒙注射，如無效，不可再留為種母猪用。（黃立章）

鷄隻每日早晚產二卵

為何後者卵殼質軟？

問：雞一日中早晚各產卵一枚，後者卵殼質軟，何故？是否病雞？（花蓮縣光復鄉潘冠東）

答：雞隻一日中早晚各產卵一枚，後者卵殼質軟的原因，乃由於製造過程尚未完全（即鈣質之分泌不完全）即產下之故。像這種雞，多是產卵能力強的，在產卵期中非常神經質，要使他安靜不要使驚嚇，產蛋的情形即可減少。（李登元）

澳洲黑鵝較晚成熟

問：澳洲黑鵝多少月成熟產卵？（花蓮

縣光復鄉潘冠東

答：澳洲黑鵝因體型較大，成熟期較晚，通常平均產卵年齡為七個半月。（李登元）

來航鷄蛋內有血絲

多半是遺傳的關係

問：來航鷄蛋內蛋白質有血液，是否病狀？何故？（花蓮縣光復鄉潘冠東）

答：來航鷄蛋內有血絲，會影響蛋的品質。像這種情形，多半是因為遺傳的關係，所以，照蛋如發現有血絲者，不宜留為種蛋之用。（李登元）

柑園種那種樹木防風？

問：柑園防風林種那種樹木最好？（臺東鎮張聰敏）

答：柑園的防風林，最常用者有刺竹、相思樹等。（蔡致誠）

柑園怎樣間作鳳梨？

問：柑園可否間作鳳梨？（臺東鎮張聰敏）

答：幼齡柑園樹齡在四年生以下，種植不過密，行間有陽光充足的隙地時，可以間作鳳梨。這樣間作鳳梨，假如鳳梨和柑桔都正常施肥，應該不影響柑桔的正常發育。（蔡致誠）

防止果樹落果一法

問：二，四一D除草劑可以混合石灰波爾多液噴射果樹防止落果嗎，配合方法如何？（臺中縣東勢鎮張善進）

答：二，四一D除草劑可以和石灰波爾多液混合噴射果樹防止落果。配合例如下：波爾多液用八斗式防治柑

橘瘡痂病及紋羽病等。二，四一D用100ppm（百萬份之十六）以防治甜橙的熱前落果。

先稱生石灰及硫酸銅各七十八公分，生石灰先用少量水化開，生石灰遇水會發高熱，須注意。待生石灰全部化開後，加二公升水調成石灰漿，硫酸銅用三、四公升水溶解，待全部溶解後慢慢倒入石灰漿水中，攪拌要慢，同時要用棒不停攪拌，使成乳藍色懸浮液再加清水成二十五公升（恰好是挑水桶一桶的容量）過濾，濾去渣滓，再加入四公分二，四一D結晶，溶解攪勻即成。注意二，四一D只能噴一次，不可常噴以免引起藥害。（蔡致誠）

鰻魚苗何處有售？

問：鰻魚苗何處有售？（東港李自強）

答：鰻苗全省都有出售，須向鰻魚商洽購，但最多的地方是淡水，在士林鎮有姓柯的鰻魚商，價格請選與鰻魚商洽定。（曾相德）附註：關於鰻魚養殖，本刊三卷十二期八頁刊有「養鰻魚的方法」，三卷二十二期七頁有「鰻的繁殖法」。

來函照登

豐年二十一期第二十七頁「田菁葉不宜做養豬飼料」一文中，田菁種子處理方法，請修正如下：田菁種粒壓扁後加水五倍，煮沸後過濾，加五倍之一份鹽酸液，浸一小時後再加水十倍過濾，然後加二份食鹽拌和，放置一二日醱酵後曬乾餵豬。（黃立群）

讀者服務

△徵求「粗花」種瓜子瓜原種二十公升。純桃園種小母猪二隻。「三國種」大豆，臺南白油豆一號種子各十公升。請函價格。（臺中縣太平鄉新平路十八號林國濟）
△出售一年生高牆棉柑，高一公尺，一萬餘株。（臺北縣新店鎮百忍里十四張路九鄰十一號林火土）
△出售大點雨杉苗，高一尺左右，二十萬株。（雲林縣古坑鄉草嶺村五三號林舜）
△徵購純種關鷄（シヤモ），公鷄三隻

本行經銷西德拜耳藥廠及日本庵原農藥出品名牌農藥，新近運到下列貨品，歡迎選購：

西德拜耳藥廠出品 富粒多乳劑
日本庵原農藥出品 馬拉松乳劑
P M 乳劑

錦昌貿易行

臺北市鄭州路23號
電話：45730號