

防治香蕉象鼻蟲，柑橘星天牛，棉花紅鈴蟲，請用美國原裝的：

ORTHO®
DIELDRIN
SPRAY

好速牌

地特靈乳劑 17.9%

... 現貨供應 ... 正源貿易行 ... 正豐農藥行

臺北市太原路 124 號 電話 45391

臺中市民權路 57 號

，母雞一隻（出生一年以內為限）。請函每隻價格。（宜蘭縣南澳鄉澳花村三九號蕭錦池）

△廉讓微龍乳羊一隻，正在產乳。（臺南市安南區北里二一二號邱火炎）

△微龍純種優良家兔（肉用手用均可），請函品種名，大小，價格。（臺南縣新營鎮新營紙廠股維垣）

△出售二、三年生乳牛若干頭。（苗栗鎮福里二一五號苗葉牧場黃秋水）

△廉讓純種奈加拉葡萄苗，大苗每株八圓，小苗五圓。（桃園縣新屋鄉東明村東明二號余家六）

△出售二、三年生乳牛若干頭。（苗栗鎮福里二一五號苗葉牧場黃秋水）

一禾三穗卜豐年

余慶東



(右) 葉分與 (左) 葉分間節上地
(攝仁敦曹) 稻水之

最近接到豐年社轉來的一封信，說是雲林縣古坑鄉東和村汪陳春德農友的稻田，發現「一禾三穗」的蘆粟稻，附近的農友都認為這是豐年的朕兆，希望有關機關派人設法採種，以利水稻增產。

在稻作學上，並沒有「一禾三穗」的名詞，汪農友的所謂「一禾三穗」，是一種「地上節間分蘖」。可能促使

發生地上節間分蘖的原因如下：

①品種：某些水稻品種容易發生地上節間分蘖，例如「臺中特六號」、「臺中六五號」等是。

②地方：臺中區農林改良場，在地方肥沃的稻田中，屢次發現地上節間分蘖。

③灌溉：灌溉水常時過深，可引起地上節間分蘖。如廣東省沙田地帶（デルタ）的在來稻，每莖都是地上節間的分蘖。

地上節間分蘖，通常是一文，像汪農友這種二文的，確是少見，可能是豐收的祥兆。

地上節間分蘖的特性，雖然略與品種有關，但並不遺傳。用汪農友的「一禾三穗」稻種，在瘠地栽培，絕不會發生地上節間分蘖。

△出售來航、蘆花、紐澳黑、澳洲黑、名古屋、一代雜種等小雞、種蛋。（臺中市北區一心路蔣雲蒼）

△廉讓純種奈加拉葡萄苗，大苗五圓，小苗三圓。（桃園縣新屋鄉埔頂村水碓十一號羅增琳）

△微矮性種油桐樹種子若干，請開價格。（南投縣信義鄉明德村豐丘派出所轉交吳重吉）

△廉讓石原牌二、四—D 除草劑，每盒十二元，一百八十盒。（臺北市臨沂街七五巷十號之一楊何惠珍）

農藥界的偉大貢獻展覽會


一、本劑混合農藥特點
①葉面容易濕潤且使農藥液慢慢延到全葉面。②固着性優秀，而農藥液布後不使風雨流失。③本劑係中性可混用各種殺蟲、殺菌劑外，可混合葉面肥料（尿素）。④少量加用（如左記說明）充分發揮藥效，而節省藥費及勞力等。⑤絕對無害，對人畜無害。⑥揮發力極小，只化四角使藥劑發揮最大效力。

二、使用量：藥劑每一大斗（十八公升、三〇公升）最適當添加量
①稻麥洋蔥鳳梨等農作物每畝作物五、四、九 cc。②果樹蔬菜馬鈴薯、菸草、香茅等比較展容易農作物一、八、五、四 cc

三、混合適用農藥：
①富粒多、馬拉松、巴拉松等有機磷類及安特靈、地特靈、阿特靈、DDT、BHC。②大生、谷仁樂生等殺菌劑。③石灰波爾多液及其他調劑。④石灰硫磺合劑及其他硫磺劑（可濕性硫磺粉）。⑤砒酸鉛及其他砒素劑。⑥松脂合劑及「カリ性劑」。⑦夏油機油乳劑、尼古丁、除蟲菊、殺菌劑、魚藥等。⑧其他各種農藥及葉面肥料（尿素）等。

◎如需詳細說明書函索即寄。◎本藥業經臺灣中區農林改良場各農會果農合作社及農家先進等購買使用，認定其效果之優秀性，故敬請各農會統籌採購。◎做行其他各種農藥具備。◎各鄉鎮農會青果合作社農藥行均有售。

日本新生農產化學工業株式會社
臺灣總代理店
信全農藥行
臺中連絡處：臺中市西區三民路一二四號
電話：一八三三號轉
行址：員林鎮中山路三九號 電話：八六號



日本農工學士最
信州大學農學部
岩田正隆
學大正隆