

棕桐栽培須知

甘偉松

棕桐樹姿優美，適於

做庭園樹及風景樹。幹材

可充庭園欄柱、燃料、用

具。樹皮可製纖維、繩纜

、毛刷、蓆衣。葉片纖維

可做繩、帽、扇等。棕桐

適於溫帶及暖帶栽培，能

耐庇蔭，最宜於潤葉樹下

生長。喜歡生長在粘土、

砂質粘土及肥沃的地方。

一、怎樣育苗

選二十年生以上母樹採種，種子十一至十二月成熟，取播或翌春播種，種子浸水一晝夜，每平方公尺播種〇·五五公升，覆土一·五公分，蓋稻草，搭蔭棚，約二月發芽，發芽率三成。移植一回。

二、陰天或小雨時造林

二年生苗高約三十公分即可出山。根過份乾燥，則成活不良。應選陰天或小雨時造林，在花蓮以十二月至一月最宜。植孔內應放堆肥、草木灰及燒土，可促進樹木生長，防除病害。以棕毛為主，一公頃三千株，若以新葉為主，每公頃五、六千株。

三、撫育及保護

棕桐樹為陰性及淺根性，應保持鬱閉度，且避免種在有強風的地方。注意中耕除草，割葉及割取棕毛時，即中耕除草，兼施人糞尿、草木灰，以促進發育。果實易為鳥啄食，幹葉易患蟲及菌害，應拔除病株焚燒。

五、有不少的用途

棕桐樹姿優美，適於做庭園樹及風景樹。幹材可充庭園欄柱、燃料、用具。樹皮製纖維、繩纜、毛刷、蓆衣。葉片纖維可作繩、帽、扇等。花房園藝場有種子出售，每公升約四十元。

四、採收

栽培六、七年後即可收穫，棕毛新葉的採收期每年三回（春、夏、秋），於新葉未開時採收，每年可收二十至二十四枚，最優良為二十七枚。

廣告更正啟事

本刊第七卷第廿一期封底裡臺灣獸醫公司大廳賞（甲）題目與第十六期者不同，但一樣有效，請各位讀者踴躍參加。

三種黃一立

家兔疾病

（1）球蟲病 出生三個月以內的仔兔特別容易發生球蟲病。患球蟲病的家兔，四肢行動不自由，下痢，很快死亡；死亡率在嚴重時可達百分之九十以上，普通約為百分之五十。

球蟲病很容易傳染，尤其在梅雨期中，青草附着雨水過多時，特別容易發生。所以飼養家兔的青飼料，必須涼乾。

在飼料中加百分之一的「消發呱啞」粉，可以預防本病。糞便堆積發酵，兔籠一個月消毒一次，或常放在太陽光下曝曬，也都可以預防本病。

如已發生球蟲病，必須隔開病兔，消毒兔籠，以防傳染。治療藥品可用「消發呱啞」，每日內服三次，每次〇·五公分。但一旦發病後，很難治療，應在平時注意預防。

（2）鼓腸病 出生後二至六個月的家兔容易發生本病，腹部膨大，腸內發生氣體。最初食慾減退，或全無食慾，漸漸精神不振，苦悶，有時嗚叫或呻吟而死。

本病發生的原因，是飼料不良，或由內寄生蟲而引起急性消化不良。青飼料給與量過多也是原因之一。治療方法，就是要設法除去發病原因；如改善飼料，給以適當量的青草，同時以人工摩擦腹部，或給安息香酸阿母尼亞〇·三公分內服，或用重曹〇·三至〇·五公分，一日二次內服。

（3）下痢 下痢的治療方法是，少給附有雨水的青草，同時給止瀉藥，如次硝

酸銻鈣每日二、三次，每次〇·三公分，或單寧蛋白〇·五公分。其他還要注意保持兔籠清潔溫暖。

