

農業信箱

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，以便本社收發迅速處理。

防止木瓜變種

需行人工交配

問：栽培蘇魯種木瓜，怎樣才能防止變種？（花蓮縣新城鄉李文哲）

答：木瓜粉靠風力傳播，所以，保純工作在木瓜栽培是很重要的。蘇魯品種栽培地附近一公里以內，如沒有栽培其他品種，雜交的機會較少。如附近木瓜栽培品種複雜，普通經過一二代後，就可能發生雜交變異。尤其是樹的高矮、果形、品質、食味、肉色等變得最顯著。木瓜保純採種法，以採用人工交配方為可靠，其次是採用隔離播種法。（戴邦本）

乳豬白痢怎樣治療？

問：請問小豬生下來就下黃褐色糞便，這是什麼病症，應用何種藥品治療？（金門縣金湖鄉呂榮集）

答：母豬生下小豬，而小豬便下黃色（有時是白色的）糞便，這是小豬的一種消化不良的現象，俗稱乳豬白痢，其原因很多，如母乳、仔豬消化力弱，氣候、飼料等，都是致病的原因。可用助消化的藥品治療。普通一小豬每次給〇·五—一〇公分重曹，一日二次，數日即可。（黃立羣）

如何糾正鷄隻互啄？

問：我的鷄隻，常互啄，應如何防止？（出磺坑礦場江望宏）

答：鷄隻互啄應避免鷄舍太擠，並增加飼料中食鹽量（原為一多增為二多），飼料三、四日即可糾正此毛病。（李登元）

鬧雞器具何處有售？

問：鬧雞用器具，什麼地方有賣？（雲林縣元長鄉莊明明）

答：鬧雞器具，請函臺北市信義路二段一二〇號臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司洽購，每套價格約一百元左右。（李登元）

野豬食害馬鈴薯

應設獵捕機防範

問：①我想在山上種植馬鈴薯，但山上野豬太多，不知野豬會不會食害馬鈴薯？②花蓮區農林改良場有沒有馬鈴薯種苗出售，每公斤價格若干，每分地需種薯多少？

③山地多是黑沙土質，是否適於種植馬鈴薯？（花蓮縣玉里鎮泰昌里北邊街廿號之六劉自孝）

答：①在山上種植馬鈴薯，假如野豬太多，會被食害，宜考慮防範措施，如設獵捕機等是。

②馬鈴薯種苗，可向臺北市中正路臺灣省農會洽購，價格不詳，每分地約需種薯九十公斤（兩箱）。大薯每個可切三片或四片，中薯切為二片，小薯以整薯種植。

③種植馬鈴薯，土地須排水良好，黃處山地，假如是新墾地，可種植馬鈴薯。（陳方）

池水愈深愈能保温

問：吳郭魚、鯉魚過多，池水要幾尺深？是否可在二三尺深的水面蓋一稻草棚保温，有效否？（花蓮縣光復鄉葉向平）

答：池水愈深愈能保温。為避免冷風吹觸而減低溫度，一定要有草棚設備。（會柘禮）

你想養家兔嗎？

問：我想養純紐西蘭種或其他好品種家兔，貴刊第七卷廿一期「養兔是農家的好副業」作者黃立群先生一定是養兔專家，假如黃先生願意的話，我很想得到他的指教。（嘉義縣六脚鄉黃信雄）

答：純種紐西蘭種家兔，現在飼養的地方很多，但不知地址，現介紹到你省立桃園農業學校去買，過去出售的辦法是先登記，價格是生後每隻十五元，以後飼料費每天五角，假如你買生後四十天的仔兔，每隻十五元，加（8×5）二十元的飼料費，即三十五元。他們養的，品種可觀。

關於養兔方面如有何問題，我很願意互相討論，我的地址是臺北農試所。（黃立群）

讀者服務

△徵購三國大豆種或百美大豆種，請函每公斤價格。（嘉義縣六脚鄉正義路中溝十七號侯源五）

△徵購十七號甘藷，數量無限，請函每公升價格。（嘉義縣六脚鄉正義路中溝十七號侯源五）

△出售甜柳丁（印仔柑）苗（一臺尺—三臺尺半，一萬五千株），桃柑苗（一尺—四尺，二萬株），正烏葉荔枝苗二千株，東山月拔一萬株。（彰化縣永靖鄉中山路二四號高嘉成）

△徵求①柳杉苗一萬株，移植一次二年生。②純種「路呼金」甜椒種子二公斤。（陽明山湖田里二六號高銘印）

△徵購本地種半個月左右小鷄十數隻，請函價格。（桃園縣平鎮鄉北勢村三三〇號戴興郎）



ORTHO
SCIENTIFIC PEST CONTROL

現貨
供應



ORTHO BUILDS BETTER YIELDS

物美價廉
美國原裝

好速牌
馬拉松乳劑
55.7% · 50%

臺北市太原路124號
正源貿易行
電話：45391

臺中市民權路57號
正豐農藥行

△出售優良苗木：大紅肉李苗(一·五—四臺尺)，砧木用苗：梅苗(直徑二臺尺一萬株)，酸柑苗(一年生，一—二臺尺)，純種中生橫山軟枝水梨苗(一·五—四臺尺)，優良高瑞柑柑，及桶柑，其他優良柑苗，相思樹苗(一年生三十萬株以上)。(新竹縣關西鎮惠愛路三號林錦雲)

△急徵收草用燕麥種子，請開示價格，數量。(新竹縣關西鎮惠愛路三號林錦雲)

△出售：①阿羅姆茶苗一萬株(二年生)，②高瑞柑柑苗四萬株(一年生，高三臺尺)。

幾種食用菇的鑑別

胡開仁

①香菇：香菇於秋末至春時生長良好，喜生於樺木、枹、橘、青岡櫟、栗、椴櫟等樹上，菇傘大小通常在三至六公分左右，表面茶褐色或黑褐色，且有許多白色不明顯的鱗片，後逐漸消失。菇褶白色與柄稍呈褐色，菇體較密而厚，肉質白色，幼茸時菇傘與菇柄間生有綿毛狀的破膜。香菇乾製後有一種芳香氣味。孢子為白色。

②覆盆：覆盆喜生於覆盆、柿、桑、白楊類、杞柳、狐柳、峰山柳等樹上，生長期為冬季至春季。菇傘通常直徑二公分左右，呈半圓形，表面淡黃色，充分成熟時菇傘開放時菇傘直徑可達四公分左右，且中央稍隆起呈暗褐色，外緣漸次為淡黃褐色。在光線不足的地方生長的，顏色較平常的稍白。肉質柔軟，色白或淡黃色。菌褶白色或乳白色。菌褶與菌柄離生，菌柄下半部生有黃褐色至暗褐色的短毛，上半部生白色短密毛。覆盆的傘表面有一種粘液，菇乾時消失，再得水分則又出現。菇孢子為白色。

③平菇：平菇多生於闊葉樹的枯木上，菇傘扇形或半月形腎臟形。表面分淡灰褐，淡黃褐或灰白等色。菌柄生在傘的側面(決沒有生在菇傘中央的)。菌柄很短。菌褶白色，與菌柄垂生。孢子為白色。

④木耳：木耳種類很多，一般分為白木耳與黑木耳兩大類。木耳主生長於櫻、栢、桑、栗等樹上。


⑤西洋松茸(洋菇)：西洋松茸多生於牧場附近的馬糞或野外腐爛的有機物上，菇傘直徑三—四公分左右，表面分白、褐、乳白等三色。中央部扁平，邊緣向下捲曲，菌褶與菌柄離生，菌褶初時為淡紅色，後變成紫褐色。菌柄大，內部充實，上有菌環。孢子橢圓形，黑紫褐色，本省人工培養者已甚多。



西洋松茸



覆盆



平菇

尺)，③高瑞柑柑苗五千株(一年生，高三臺尺)，④純良印子柑苗二千株(一年生，三臺尺)⑤晚命西亞苗六千株(一年生，三臺尺)。(桃園縣大溪鎮中新里一三二號陳世鈞)

△廉讓鴉鳥一組(一雄二雌)出生已四十日，將產卵。(雲林元長鄉龍岩村五二號吳煥秀)

△垂讓小葉桃花心木苗三〇〇株，苗高三〇—九五公分(嘉義市中山路一三七號市農會許祖模轉洽)

大生七十八 防治小麥銹病粉劑

(摘自臺灣省農林廳種苗繁殖場民國四五年小麥銹病藥劑防治試驗簡報)

防治：小麥葉銹病(Leaf rust)及稈銹病(Stem rust)且能於小麥孕穗期開始噴撒殺菌藥，每隔二週一次，連續三次，則可保無慮。2. 殺菌藥劑中以大生(Dithane Z-78) 效果最佳，在盛花期中噴撒任何殺菌劑(指大生蓋撲丹及石灰硫黃液三者而言)對小麥花粉及結實，皆無影響，麥粒仍舊飽滿充實。3. 本省中部小麥的播種期為下旬(十月二十五日至十一月五日，十日間)，銹病的發生期為第二年的二月上中旬而收穫期則為三月中下旬，發病期距收穫期為一個月左右。

可利生 (Karathane WD.)

防治：①西瓜木瓜之白粉病及蛛滿一鳳山農林試驗所研究結果以可利生防治效果最為特色。②灌木、喬木果樹苗木及花卉之白粉病及蛛滿蟲害極佳。

◎說明書函索附郵票四角即寄

羅門哈斯公司臺灣總代理

青象貿易有限公司

臺北市中正路1756號 電話：27467

現貨供應處

臺北市中正路1752號 中國土產公司
 新竹市中正路78號 中安太清農
 臺原市中正路143號 牛生大西藥房
 臺中市繼光街29號 原工業原料
 嘉義市中正路485號 禾友種子苗
 鳳山鎮第二市場148號 房行行店



好消息!!

介紹 由外國進口優良蔬菜種子，保證豐收，敬請賜顧。

◎荷蘭交配A號白菜子(新品種結球白菜)

◎美國紅心五寸人參子

◎美國比亞里昂特馬托子

◎正日本美濃早生大根(黑葉系)

◎其他美國球型洋蔥子金澤結頭子三池中甘藍自慢種京都三號山東白菜子大梅花大根アリチャードトマトグレットレグ玉チンジャ塔菜(香港) 清江白菜日本菠菜

◎西洋菇菌(マツシユールム) ホワイト(白色) ブラウン(灰褐色) クリーム(乳白色)

◎農藥：水銀ホルドゥ 「津村」エンドリン等

◎各種藥業噴霧器林木種苗花卉種子均有備做所照會賜顧若蒙目錄說明書寄郵票一元函索即寄

合成種子行

臺北市迪化街二一五號
 電話：四三三三三號
 郵政劃撥金二二四三三號