

△出售優良苗木：大紅肉李苗(一·五—四臺尺)，砧木用苗：梅苗(直徑二臺尺一萬株)，酸柑苗(一年生，一—二臺尺)，純種中生橫山軟枝水梨苗(一·五—四臺尺)，優良高瑞柿柑，及桶柑，其他優良柑苗，相思樹苗(一年生三十萬株以上)。(新竹縣關西鎮惠愛路三號林錦雲)

△急徵收草用燕麥種子，請開示價格，數量。(新竹縣關西鎮惠愛路三號林錦雲)

△出售：①阿羅姆茶苗一萬株(二年生)，②高瑞柿柑苗四萬株(一年生，高三臺尺)。

幾種食用菇的鑑別

胡開仁

①香菇：香菇於秋末至春時生長良好，喜生於椎木、枹、橘、青岡櫟、栗、椴櫟等樹上，菇傘大小通常在三至六公分左右，表面茶褐色或黑褐色，且有許多白色不明顯的鱗片，後逐漸消失。菇褶白色與柄稍呈褐色，菇體較密稍硬，肉質白色，幼茸時菇傘與菇柄間生有綿毛狀的破膜。香菇乾製後有一種芳香氣味。孢子為白色。

②覆盆：覆盆喜生於覆桐、柿、桑、白楊類、杞柳、狐柳、峰山柳等樹上，生長期為冬季至春季。菇傘通常直徑二公分左右，呈半圓形，表面淡黃色，充分成熟菇傘開放時菇傘直徑可達四公分左右，且中央稍隆起呈暗褐色，外緣漸次為淡黃褐色。在光線不足的地方生長的，顏色較平常的稍白。肉質柔軟，色白或淡黃色。菌褶白色或乳白色。菌褶與菌柄離生，菌柄下半部生有黃褐色至暗褐色的短毛，上半部生白色短密毛。覆盆的傘表面有一種粘液，菇乾時消失，再得水分則又出現。菇孢子為白色。

③平菇：平菇多生於闊葉樹的枯木上，菇傘扇形或半月形腎臟形。表面分淡灰褐，淡黃褐或灰白等色。菌柄生在傘的側面(決沒有生在菇傘中央的)。菌柄很短。菌褶白色，與菌柄垂生。孢子為白色。

④木耳：木耳種類很多，一般分為白木耳與黑木耳兩大類。木耳主生長於櫻、栢、桑、栗等樹上。

⑤西洋松茸(洋菇)：西洋松茸多生於牧場附近的馬糞或野外腐爛的有機物上，菇傘直徑三—四公分左右，表面分白、褐、乳白等三色。中央部扁平，邊緣向下捲曲，菌褶與菌柄離生，菌褶初時為淡紅色，後變成紫褐色。菌柄大，內部充實，上有菌環。孢子橢圓形，黑紫褐色，本省人工培養者已甚多。



西洋松茸



覆盆



平菇

大生七十八 防治小麥銹病粉劑

(摘自臺灣省農林廳種苗繁殖場民國四五年小麥銹病藥劑防治試驗簡報)

防治：小麥葉銹病(Leaf rust)及稈銹病(Stem rust)且能於小麥孕穗期開始噴撒殺菌藥，每隔二週一次，連續三次，則可保無慮。2. 殺菌藥劑中以大生(Dithane Z-78) 效果最佳，在盛花期中噴撒任何殺菌劑(指大生蓋撲丹及石灰硫磺液三者而言)對小麥花粉及結實，皆無影響，麥粒仍舊飽滿充實。3. 本省中部小麥的播種期為下旬(十月二十五日至十一月五日，十日間)，銹病的發生期為第二年的二月上中旬而收穫期則為三月中下旬，發病期距收穫期為一個月左右。

可利生(Karathane WD.)

防治：①西瓜木瓜之白粉病及蛛滿一鳳山農林試驗所研究結果以可利生防治效果最為特色。②灌木、喬木果樹苗木及花卉之白粉病及蛛滿蟲害極佳。

◎說明書函索附郵票四角即寄

羅門哈斯公司臺灣總代理

青象貿易有限公司

臺北市中正路1756號 電話：27467

現貨供應處

臺北市中正路1752號	中國土產公司
新竹市中正路78號	民生大藥房
臺原市中正路143號	西藥原料行
臺中市繼光街29號	食大藥房
嘉義市中正路485號	農工藥房
鳳山鎮第二市場148號	中原藥房



好消息!!

介紹 由外國進口優良蔬菜種子，保證豐收，敬請賜顧。

◎荷蘭交配A號白菜子(新品種結球白菜)

◎美國紅心五寸人參子

◎美國比亞利昂特馬托子

◎正日本美濃早生大根(黑葉系)

◎其他美國球型洋蔥子金澤結頭子三池中甘藍自慢種京都三號山東白菜子大梅花大根アリチャードトマトグレートレグ玉チンジャ落葉菜(香港)清江白菜日本菠菜

◎西洋菇菌(マツシユールム) ホワイト(白色) ブラウン(灰褐色) クリーム(乳白色)

◎農藥：水銀ホルドゥ 「津村」エンドリン等

◎各種藥業噴霧器林木種苗花卉種子均有備做所照會賜顧若蒙目錄說明書寄郵票一元函索即寄

合成種子行

臺北市迪化街二一五號
電話：四三三二二號
郵政劃撥金二二四三三號