

幾種食用姑的鑑別


胡開仁



西洋松茸



平菇



櫻菇

- ① 香姑：香姑於秋末至春時生長良好，喜生於椎木、枹、櫟、青岡櫟、栗、櫟櫟等樹上，姑傘大小通常在三至六公分左右，表面茶暗褐色或黑褐色，且有許多白色不明顯的鱗片，後逐漸消失。姑褶白色與姑柄呈彎生，姑體緻密稍頑韌，肉質白色，幼時姑傘與姑柄間生有綿毛狀的被膜。香姑乾製後有一種芳香氣味。孢子為白色。
- ② 櫻菇：櫻菇喜生於櫻樹、柿、桑、白楊類、柏柳、沉柳、峰山柳等樹上，生長期為冬季至春季。櫻傘通常直徑二公分左右，呈半圓形，表面淡黃色，充分成熟姑傘開放時姑傘直徑可達四公分左右，且中央稍隆起呈暗褐色，外緣漸次為淡黃褐色。在光線不足的地方生長的，顏色較平常的稍白。肉質柔軟，色白或淡黃色。菌褶白色或乳白色。菌褶與菌柄離生，菌柄半部生有黃褐色的短毛，上半部生白色短毫毛。櫻蕈的傘表面有一種粘液，姑乾時消失，再得水分則又出現。姑孢子為白色。
- ③ 不姑：不姑多生於闊葉樹的枯木上，姑傘扇形或半月形，菌形。表面分淡灰褐，淡黃褐或灰白等色。菌柄生在傘的側面，決沒有生在姑傘中央的。菌柄很短。菌褶白色，與菌柄垂直。孢子為白色。
- ④ 木耳：木耳種類很多，一般分為白木耳與黑木耳兩大類。木耳生長於櫟、榕、桑、栗等樹上。

⑤ 西洋松茸（洋姑）：西洋松茸多生於牧場附近的馬糞或野外腐爛的有機物上，姑傘直徑三至四公分左右，表面分白、褐、乳白等三色。中央部扁平，周緣向下方捲曲，菌褶與菌柄離生，菌褶初時為淡江色，後變成紫褐色。菌柄大，內部充實，上有菌環。孢子橢圓形，黑紫褐色，本省人工培養者已甚多。

- 一四臺尺），砧木用苗：海苗（直徑二臺分一萬株），酸桔苗（一年生，一至二臺尺），純種中生橫山軟枝水梨苗（一·五至四臺尺），優良高壇柑，及桶柑，其他優良柑苗，相思樹苗（一年生三十萬株以上）。（新竹縣關西鎮惠愛路三號林錦雲）
- △急徵收草用燕麥種子，請開示價格，數量。（新竹縣關西鎮惠愛路三號林錦雲）
- △出售：①阿薩姆茶苗一萬株（二年生），②高壇桶柑苗四萬株（一年生，高三臺

- 尺），③高壇柑苗五千株（一年生，高三臺尺），④純良印子柑苗二千株（一年生，三臺尺），⑤喚倫西亞苗六千株（一年生，三臺尺）。（桃園縣大溪鎮中新里一三二號陳世鈞）
- △廉讓鸚鵡一組（一雄二雌）出生已四十日，將產卵。（雲林元長鄉龍岩村五二號吳榮秀）
- △產讓小葉桃花心木苗三〇〇株，苗高三〇一九五公分（嘉義市中山路一三七號市農會許祖模販售）

合 成 種 子 行

◎各種農藥噴霧器林木種苗花卉種子均供所服會賜顧若要目錄說明請寄郵票一元
函常即寄

- 好 消 息 !!
- 由外國進口優良蔬菜種子，保證豐收，敬請賜顧。
- ◎荷蘭交配A號白菜子（新品種結球白菜）
- ◎美國紅心五寸人參子
- ◎正日本美濃早生大根（黑葉系）
- ◎美國比牙一ントマト子
- ◎長岡交配二號白菜子
- ◎農藥：水銀ボルドウクリーム（乳白色）
- ◎西洋松茸（洋姑）：西洋松茸多生於牧場附近的馬糞或野外腐爛的有機物上，姑傘直徑三至四公分左右，表面分白、褐、乳白等三色。中央部扁平，周緣向下方捲曲，菌褶與菌柄離生，菌褶初時為淡江色，後變成紫褐色。菌柄大，內部充實，上有菌環。孢子橢圓形，黑紫褐色，本省人工培養者已甚多。

大生七十八 防治小麥銹病粉劑

（摘自臺灣省農林廳種苗繁殖場民國四五年小麥銹病藥劑防治試驗簡報）

防治：小麥葉銹病（Leaf rust）及秆銹病（Stem rust）且能於小麥孕穗期開始噴散殺菌藥，每隔二週一次，連續三次，則可保無慮。2.殺菌藥劑中以大生（Dithane Z-78）效果最佳，在盛花期中噴散任何殺菌劑（指大生蓋撲丹及石灰硫黃液三者而言）對小麥花粉及葉，皆無影響，麥粒仍舊飽滿充實。3.本省中部小麥的播種期為下旬（十月二十五日至十一月五日，十日間），銹病的發生期為第二年的二月上旬而收穫期則為三月中下旬，發病期距收穫期為一個月左右。

可利生 (Karathane WD.)

防治：①西瓜木瓜之白粉病及蜘蛛—鳳山農林試驗所研究結果以可利生防治效果最為特色。

②蘿蔔、薺木果樹苗木及花卉之白粉病及蜘蛛蟲害極佳。

◎說明書函索附郵票四角即寄

羅門哈斯公司臺灣總代理
青象貿易有限公司
臺北市中正路1756號 電話：27467

現貨供應

臺北市中正路1752號	號	號	號	司房房行店
新竹市中正路78號	號	號	號	公
豐原市中正路143號	號	號	號	食品藥物原子苗
臺中市繼光街29號	號	號	號	大西業種種
嘉義市中正路485號	號	號	號	李生原河友
鳳山鎮第二市場148號	號	號	號	中國土中安太清農

