

本省颱風特多，一般抗風力不強的樹木，如柚林、桉樹、銀樺、鐵刀木等，時常因颶風而倒斷，這對造林者的威脅着實太大。

桃花心木單幹矗立，橫枝很小，受風面積不大，又因枝幹堅硬，根部粗大，所以，抗風力特別強。去年颶風過境，桃花心木折損的很少。由此可見，在本省南部栽培桃花心木，比種植其他樹種，都要有利得多。

本省檜柏、鷄油、烏心石等高級木材行將缺乏，將來收復大陸，高級木材的需要量很多。現在大量造林桃花心木，是很有前途的。

三、造林時期可分三期

桃花心木的種子形狀扁平，很輕軟。大葉桃花心木的種子有指頭大，每磅一千粒左右。小葉桃花心木的種子，比大葉桃花心木的種子小一半，每磅二千粒左右。因為大葉桃花心木的生長比較小葉桃花心木快得多，要造林最好用大葉桃花心木。本省南部海拔六百公尺以下的林地，很適於大葉桃花心木的造林。種子播種後，如有適宜陽光與水份，經過兩個禮拜開始發芽。發芽後，生長很快，如在三、四月中播種的，到了七、八月間苗高已達三十公分，如在八、九月間播種的，到了明年二、三月裡也就可以拿出去造林了。幼苗很嬌弱，應小心防治病蟲害。蟲害以土猴、蝸牛最利害。苗木移植時，不須切幹，把所有葉子除去就可。根部應防傷害，不必帶土，能够帶土，當然更好。栽植法與一般樹木同，應踏實根部四圍土壤。造林地以表土深厚的植實壤土為最佳。造林時期可分做三期：農曆冬節前後十天，清明前

後十天，與芒種前後十天。造林後應充分灌水，最好在雨後栽植。成活率平常在百分之九十以上。造林株數似以每公頃一千六百至二千株為宜。中間混植相思樹，至七、八年後，把相思樹全部除去，對撫育有益。至十五年後林相過密，應施行間伐，除去被壓劣勢木，藉以疏開樹冠。以後看實際情形，再行第二次第三次間伐，每公頃留存五百株至六百株主伐木。到了三、四十年左右，就可生產優良巨幹材。

農復會在民國四十四年向南美購進大葉及小葉桃花心木種子，分配南部林業機構育苗造林三十餘公頃，現在苗高二公尺以上。四十六年又購進小葉桃花心木及大葉桃花心木種子一批，預計在四十七年春期出山，再由中南部造林機關造林三十餘公頃。這兩批桃花心木如能撫育順利，將來本省大量推廣，就可自給的種子了。（揮圖說明：八頁照片，是嘉義縣竹崎鄉灣橋在四十五年一月一日種植的大葉桃花心木。四十六年十一月五日攝）

· 啓事 ·

本刊第七卷第十二期介紹過臺東的「晚命西亞」甜橙園——富榮農場。當時，我們曾經提醒各位，有些商人拿其他的柑橘苗冒充「晚命西亞」出賣，如果有意栽培「晚命西亞」的，最好先和有關機關聯繫。最近，又發現有幾家苗商假借富榮農場的名義，說是「豐年」介紹的好苗，在各地銷售，以至發生糾紛。據富榮農場來信說，該場苗木除由臺東區農林改良場統籌推廣外，並沒有委託任何苗商代售，希望各位柑農注意。



厚無蘭阿勸苦，理明有見聽火阿⑥
往來邊厝，喜歡人過改此從，舌。
。例例笑



嘴厚人做蘭阿，起講就婆孃壁隔⑥
害兼人害(話多)話厚，(舌長)舌
(舌長何爲)年卜是話厚人做，已



輕看邊厝何爲，悲傷也已自蘭阿④
問問去走，奇正真着想火阿，伊
。(居隣問)邊厝因