

新

恭

即可供栽種。如塗抹後，在切口未乾前裝入箱內，可能發熱，促使病菌繁殖，栽種後發生腐爛機會較多。栽種後因灌溉致使種薯腐爛，可能是種薯帶有病菌或土地排水不良，所以栽培土地排水要好，種薯應該要消毒（方法請參看豐年報第五卷二十二期第六頁）才能避免發生種薯腐爛。（盧梅桂）

木麻黃為什麼會枯死？

問：我使用一塊砂質園地，面積約四公頃，專用來移植培養木麻黃苗。每年移植期在九至十月間，且移植後的樹苗，

都充分灌水，但不知怎樣，每年移植於這個苗圃地的樹苗，大都於移植後十天左右，先由樹苗的根部開始枯乾，漸至全株枯死，成活率只有三、四成。請問這是什麼原因，該如何補救。（雲林縣青背鄉草湖林務所廖興貴）

答：沿海地區土壤多含鹽份，疏鬆沙土鹽類上升土表面。所以，你的木麻黃幼苗或活率不佳。可用深耕破除土壤硬層，行排水灌溉法，並可先行種玉米，棉花及綠肥植物，或堆肥以改良土性。（甘偉航）

豆餅為什麼含有白粉？

問：最近在豆餅內發現白細粉似的物質，不知是什麼？寄上頂上豆餅一小包，請指示。（高雄縣鳥松鄉林章盛）

答：寄來的豆餅樣本，經化學分析，蛋白質含量並不比一般豆餅少。美援隆泰牌豆餅的平均成分大約如下：

水分	蛋白質	脂肪	纖維	無氮浸出物	灰分
7.5%	26.5%	6.8%	3.5%	3.5%	4.5%

你所說的白細粉，是黃豆粉，並不是其他物質。（鄭謀平）

最新優良特效農藥

正日本原裝三共、北興、日產石原等商社出品

洋蔥、馬鈴薯、一切病害特效藥

●裕米農 一〇〇cc裝 一打四〇元

●馬拉松乳劑 一〇〇cc裝 一打三五元

●新拉吉乳劑 一〇〇cc裝 一打四〇元

●地亞淨乳劑 一〇〇cc裝 一打四〇元

●保柑藥（坎基特）三〇〇cc裝 一打五〇元

●菸草脫芽乳劑（坎基特）三〇〇cc裝 一打五〇元

●二四〇除草藥五〇克（一分地用）一包一八元

以上農藥價格係指郵費在內，十打以上打九折優待

●美國、日本、冬季、春季優良蔬菜種子

●日本、日本、冬季、春季優良蔬菜種子

●日本、日本、冬季、春季優良蔬菜種子

●日本、日本、冬季、春季優良蔬菜種子

●日本、日本、冬季、春季優良蔬菜種子

●日本、日本、冬季、春季優良蔬菜種子

●日本、日本、冬季、春季優良蔬菜種子

●日本、日本、冬季、春季優良蔬菜種子

●日本、日本、冬季、春季優良蔬菜種子

●日本、日本、冬季、春季優良蔬菜種子

臺灣農業資材公司

電話：四四二五三、四二六六五
臺北市通化街一段八六號

洋菇栽培好消息

要有正確栽培技術，才能容易成功

實地經驗 西洋磨菇栽培書 賴金城著 每冊廿元

木菇類 金錢菇 人工的栽培法 每冊五元

有優良菌種，即能豐收

洋菇孢子純粹培養菌種（乾燥式）每坪分四〇元

木菇類菌種，試驗管裝（可植二百瓶）每支廿元

以多年的改良，純粹孢子培養，在本省獨一無二，自屬而無愧之優良菌種。

△目錄免費贈送，函索即寄▽

發收處：三九帽行賴金城

本國歷史 本國歷史 本國歷史

本省規模 本省規模 本省規模

栽培場：金城養菌園

讀者服務

△徵購織造草繩機，請函規格及價錢。
（嘉義縣大湖鄉山仔頂村一四號謝欽富）
△出售生薑二十萬公斤（花蓮市忠孝街五六號邱義福）
△出售梧桐苗五萬株，每株四角。（花蓮市忠孝街五六號邱進壽）
△售純種茶加拉苗。（臺北縣中和鄉潭墘村安樂路一八八號周有水）
△徵求初生來亨小公雞，不拘數量，能經常供應最佳，請函價格、數量、日期等。（臺北縣中和鄉中和路一三二巷六弄四號金友三）

南部能種三國種大豆嗎？

問：①三國種大豆播種適期是什麼時候？
②黃刊七卷十四期介紹過「新竹地區的三國種大豆栽培」，請問在南部也能種三國種大豆嗎？
③什麼地方可以買到可靠的大豆種子？
④我有一個朋友，向農會領到三國種大豆種子，播種結果發芽率不好，為什麼？
⑤三國種大豆每年可以播幾次？（雲林縣西螺鎮張守恭、臺南縣後壁鄉蘇原）

答：①在南部三國種大豆播種期，據雲林縣農會試作報告，春季於一月中旬下旬，夏季於八月中下旬播種最好。在雲林縣以南栽培，請參酌該播種期，春播提早，夏播延晚播種，就有可能栽培。
②在本省南部栽培大豆，最好用百美豆。據最近高雄區農林改良場的試驗報告，在本省南部以百美豆產量最高，並在春夏秋季都可能栽培。你如對三國種栽培有興趣，不要栽培多，以試作範圍內試試吧。
③三國種種子請向新竹、苗栗等縣農會洽購，百美豆請向高雄區農林改良場洽購。
④大豆種子發芽率不好，可能因農人們不明白種子貯藏方法。大豆種子很容易吸收水分，隨便放置，容易變質而發芽率低下。種子最好要十分乾燥後，再混合五十分之一保寧粉，以密封器具貯藏。又在播種期，種子開封後，因天氣轉變，無法播種時，亦要再密封貯藏，這樣才能保存發芽率。
⑤三國種大豆，在新竹地區限於七月中下旬播種一次。花蓮區，據花蓮縣農會報告，二月上旬播種一次，七月上中旬播種一次，計一年兩次。雲林縣據該縣農會報告，一月上旬播種一次，八月中下旬播種一次，計兩次。（洪再傳）