

活。種植前要剪一部份枝條，以減少水分蒸發。定植前，植穴要加入堆肥一、二擔與土混合。植後要經常灌水。土壤不肥沃，又不施堆肥，雖然水份充足且已發生新葉，苗木仍有枯死的危險，這是因為營養份不繼所致，所以在植後二、三個月內，已有新葉發生，就須施稀薄的水肥（人糞尿），促進發育。

颶風來臨時，荔枝樹易被吹折，為害不淺。烏葉品種枝條比較脆弱，不耐風患，如在種植時樹旁栽種三、四株赤葉品種，然後靠接於分枝處，使成爲四、五枝的主幹，內部交叉的枝，也相互牽連靠接，互相牽制扶持，可以減少颶風爲害，又可增進生育。

三、合理的施肥

荔枝樹所用的肥料，通常以人糞尿或豬屎尿較多，每株施用一、二擔（十年生左右），再配合少量花生餅及加里與磷酸，或用過磷酸鈣二十%，食鹽二十%，大豆餅四十%，石灰二

十%等的混合肥料，在樹冠周下面，掘深三十公分的溝，每株十年生樹施用十公斤左右，然後覆土；每年於花開前（一、二月）施用一次，採果後（六、七月）又施用一次。五年生的樹照上述混合比例，分爲二次施用。如單用氮肥，或氮肥用量過多，會刺激荔枝生育，減少開花或不開花。樹齡漸大，結實數量較多，需要增加肥料用量。假如不增用肥料，結果數量就難望增多。

四、缺水易落果

荔枝果實發育期間，剛好是旱季，平地可以灌溉的，需要每半個月或一個月灌溉一次。本省中部及北部雨水較多，旱害不如南部的嚴重，南部如在此時期不降雨，落果相當利害。山地不得灌水的，可用陶缸（木桶易被白蟻損害），底部留一孔，埋入樹下，然後盛滿水，水份就可源源流入土中，雖然花費勞力不少，但也是合算的。

種菜豆獲利多

嘉義縣新港鄉 陳糖

菜豆（豇豆）真容易栽培，產量多，價格好，下面是我去年栽培菜豆的經驗。

(1) 好的菜園 種菜豆的地點要高溫，排水好。

(2) 選擇白菜豆 菜豆最好選擇白菜豆（白裙帶），白菜豆長約二臺尺多，產量多，價格好，比較黑菜豆可增產三成（百分之三十）以上，請諸位農友要種一定要選白菜豆。


(3) 不可提早下種 菜豆在立春後十餘天下種，算是最早，請農友們不要提早下種，提早下種是非常不利的，因爲農曆十二月正月常有寒流侵襲，菜豆幼苗生育緩慢，易遭寒冷而死。

(4) 施肥與灌水 種植後一個半月，每分地施用水肥二十擔，然後再施鉀肥和硫酸銨（分量各半），每分地不超過二十臺斤。假使沒有施鉀肥，葉多又大，花蒂被葉蓋下，結果不好。

在三月至四月，往往發生亢旱，每星期要灌水一次。



友農種陳



父母愛子，子爲父事。和氣忍人，人爲子事。和氣忍人，人爲子事。和氣忍人，人爲子事。



二拍人，二拍人。二拍人，二拍人。二拍人，二拍人。二拍人，二拍人。



甲拍人，甲拍人。甲拍人，甲拍人。甲拍人，甲拍人。甲拍人，甲拍人。