

，使初期發育強壯，同時堆肥能改進土質，使根瘤菌發育良好。

三、強株必先強種

花生發芽所需要的養份，都由種子供給。不飽滿的種子貯藏的養份，不夠發芽需要，因此發芽不良，影響生育。農友們，千萬要選用飽滿的種子，不飽滿的要檢出來作食用。

播種時用「賜保根」藥粉拌種（種子一公斤加藥粉八公分），可促進發芽整齊，預防菌核病，減少枯萎，增加收穫株數，目前各鄉鎮還存有這藥粉，農友們可充分利用。

四、中耕除草要小心

落花生發芽後十天以內，就要舉行第一次中耕除草。第二次中耕除草約在第一次後二十天實行。至於第三次，要看有沒有雜草發生而決定施行，但最遲應在開花後二十天內實行，同時要趁這次除草之便，將行中的土稍培向株邊，作為培土；但是菌核病發生多的地方，就不必培土，以免誘發病害更烈。

每次中耕除草，都要小心，不可傷害根部及根瘤菌等，株邊的雜草應用手拔除。當你們上午除草中午回家時，回顧一下，也許會看到一部份花生株已枯萎，這就是不小心中耕除草，傷害根莖部的結果。有時，菌核病病菌可從傷口侵入發病，可能減少收穫株數，而影響產量。

五、什麼時候收穫？

落花生播種後約一百二十天，或開花後（開花半數算起）九十天，就可收穫，過早過遲收穫都不好；因過早種仁還沒飽滿，過遲帶（子房柄連接莢果部位）易脫落，都可能減收。不照上法算日數，在園中隨便拔數株，如果大部份莢果的花紋明顯，種仁皮部已呈淡紅色，就表示可收穫了。採收時應垂直拔起，絕不可扭轉後拔起，以免莢果留在土中。

水稻冠軍在臺東

臺東鎮彭阿康農友，是四十六年度臺東地區第一期水稻增產競賽的冠軍，下面就是彭農友增產水稻的要點：

①採用純良的稻種：彭農友由多年的經驗，發現嘉南八號最適於他的水田栽培。純淨的稻種，發芽率較高，所以彭農友的稻種，每種植三期以後，都要更新一次。

②疏播育良苗：每坪秧田播種四合種子，這樣可以育得強健肥大的秧苗。

③正條密植：秧苗四至五葉時揀秧，實行正條密植。


④多用堆肥：臺東水田地力貧瘠，要增產水稻，要多施用堆肥，改良土壤。

⑤降低田面溫度：為防止夏天高溫妨礙水稻發育，及稻熱病發生，盡量使田水流通，降低田面的溫度。

⑥成熟期慢慢排水：臺東地區土質特殊，為防止紋枯病及稻熱病發生，成熟期要慢慢排水。



友農康阿彭



當此樂快庭家，喜歡真爐圍年過⑥
賭）歡愛，李慈共張體憐可，時
。（苦何）年卜是嫵愛（



傷兼費浪必何，知就神意誠心誠⑥
糖）仔糖，拜來買燭香許小，財
。害有也多食（



神拜返買燭香，定堅有氣志旺添④
裨做衫剪，敬母父品補心點，明
。穿子（妻）某