百美豆栽培要點

劉文慶

一、整　地

栽培百美豆，整地精細，可以增加產量，播種前應將土地犂耕一、二次，然後細碎土塊，耙平地面，再開植溝及排水溝，栽培地如排水不良，宜作畦。

二、播　種

百美豆在屏東地區播種期，春播以驚蟄前（二月下旬至三月上旬）為宜，夏播以芒種前後（五月下旬至六月上旬）為宜，秋播以寒露前後（九月下旬至十月上旬）為宜。播種方式以條播或點播較好，撒播不宜採用。每公頃播種量，春播和夏播為三十公斤，秋播為四十公斤。播種深度以二至四公分為宜。行距春播和夏播以四十五至五十公分為宜，秋播以四十公分為宜，株距春播和夏播以二十公分為宜，秋播以十至十五公分為宜。

三、施　肥

百美豆每公頃施肥量，春播和夏播堆肥五、〇〇〇至八、〇〇〇公斤，過磷酸鈣一百五十至二百公斤，硫酸鉀三十至五十公斤。夏播百美豆莖葉繁茂，施肥量可以減少一些。秋播百美豆如生育初期發育不良，可施稀薄人糞尿或每公頃施硫酸銨三十公斤作追肥，以促其發育。以上肥料的用法，堆肥全部用作基肥，過磷酸鈣和硫酸鉀以一半作基肥，一半作追肥，追肥應於第一次中耕除草及培土時施用。

四、管　理

中耕除草與培土均宜及早實施，使雜草不易滋生，水分肥料得以維持，供給大豆攝取。幼苗出土後兩星期內行第一次中耕除草，以後看雜草滋生情形，再行中耕除草一、二次。開花時不宜中耕，以免妨礙結實。中耕除草時，將條間兩側的土壤向植株間培土，培土高度以六至十公分為宜。

五、灌溉與排水

百美豆需要的水分較在來種為多，生育期間，平常不需灌水，如遇土壤過度乾燥時，則需灌水，使土壤保持濕潤。田間如有積水應即排出，以免影響根瘤菌的活動。

六、種子之選擇

種子的優劣對產量影響很大，栽培百美豆必須注意選種，其標準如下：①種子純度應在九七%以上，②受損種子（破粒種子）應在五%以下，③夾雜物應在二%以下，④水分含量應在一三%以下，⑤無病蟲害，⑥發芽率應在八〇%以上。農友們如需要合於上述標準的「百美豆」種子，可向屏東縣內埔鄉農會或佳冬鄉農會購買。

春季優良種子

◎白雪香瓜（シロメユキラシ）

（兩臺三購限客顧每元〇五兩臺一）

菜韭用花採季四△ ソロメユニ本日△
藍甘球結季三配交△ トスベスレイハ△
菜白球結壽春崎野△ ソロメ六三九
マト號一配交福赤△ ドーオフーキツロ△
ソロメ
マト型大配交福赤△ 瓜甜型大金黃△
瓜西和大丸大本日△
瓜西寶嘉本日△
マト配交號二壽福△ 瓜胡成節皮寶豐農△
瓜胡成節蔴余本日△
トプーログマ國美△ 苣萵球結國美△
苣萵莖嫩國美△
スガラバスア國美△ 參人寸五無時國美△

升公一 元〇〇二 松球琉用林造◎

ラガヤイナ正苗葡萄◎

（算另費運）元四株每

【寄即索函法辦始開約予菌種菇草】

冊手友農年八五九一印編司公本』：註
『寄即索函（蕈蘑）元二費本成附

司公業企產農灣臺
司公材資業農灣臺

號六八段一街化廸市北臺
五六三二四　三五二四四話電
號九九七二一灣臺儲劃

林業界◎好消息

◁種樹取採自親量大▷

、松黑本日、松葉五、松尾馬思相、楊赤、木心欄、石心烏鐵、檜黃、檜紅、杉葉擴、樹黃麻木、樹桉、杉

◁木苗林造壯強養培自親園造▷

球流、雨點大、杉葉廣、杉柳、樹桉、樹思相、松尾馬、松樹桉水香、樹華銀、黃廣木

◁子種肥綿良優種各▷

青田、豆瓜虎、麻陽太、氷魯等……歡合銀、

◁木苗樹果種各▷

柑梨海、柑桶、柑椪、梨山橫木砧、苗葡萄種各、李肉紅、桃楊、柚旦文豆麻、苗桔酸用等……苗

設師枝朗元林家專藝園聘特◎
園造包承、園庭、園公計

寄即索函送贈表錄目◎

園苗種林農灣臺
社藝園薇薔

號四九一段二路北慶重市北臺
號二二六三一座口金儲撥劃