經驗技術

秋植百美豆經驗談

高雄縣橋頭鄉　刁鬱

百美豆年中分春、夏、秋三期都可以栽培。但是希望產量高，必須用心栽培，及時做好各種作業，千萬不能馬虎。下面是我秋天種植百美豆的經驗談。

一、整　地　播種前一星期，每公頃施用堆肥一萬五千公斤，然後耕犂二次，繼續細碎土塊，耙平地面。

二、播　種　選定播種期（十月上旬秋植），每公頃預先選種子四十公斤。播種前用牛犂開淺溝，淺溝距離爲三十五至四十公分（秋植），然後在植溝每隔十公分點播種子二粒。

三、施　肥　種子播完後，即時每公頃施用化學肥料：氮五十至八十公斤，磷一百五十至二百公斤，混合散施土面後，用手耙覆土。另外在培土時每公頃施氮肥一百公斤於根部，然後施行培土。

四、灌　漑　百美豆的生育期，比較在來種需要多點水分，尤其，秋季雨量缺少，如果播種後，沒有降雨，需要灌水三次，如果不灌水，就會影響生育，產量會減少到一半以上。所以，百美豆圃地，必須選在灌水方便的地方。

五、病蟲害防治　發芽後三日至一星期，噴射安特靈或PM一次預防。以後，每隔一個月施行第二次及第三次噴射。

六、中耕、除草、培土　播種後二星期，舉行第一次除草工作。再二至星期後，施行二次除草，並施用氮肥一百公斤於根部，然後培土灌水一次（不積水的程度）。

以上所說的施肥、灌漑、除草、培土，及病蟲害防治等工作，最好在播種後一個月以內做完，最遲也不得超過四十天，假如不及時做好，便會影響生育，減少產量。

我用如上的栽培法，秋期每公頃收穫三千六百五十臺斤。

刁鬱農友

豐登牌

速效氮肥

Nitro-Chalk

硝酸鈣

硝酸アンモニア石灰

三大特點
一、含氮量高，達20%以上
二、用法和效力與硫酸錏同，人人會用，效果立見。
三、適用于微酸性土壤或中性土之作物，旱地作物尤宜。

洽購處：花蓮氮肥公司營業課
地　址：花蓮市民意里25號
電　話：386　146　492

其他產品：無水氨、硝酸、氨水、氧氣