

藥約十公分，加水約二、三大碗，一日給二次。或用單寧二十五公分（一日量），加適量麵粉，一日分二次給。②助消化：止痢後給消化藥，稀鹽酸一次十立方公分，每日二次，或用膽汁末每日二次，每次三十公分內服。（黃立羣）

臺糖飼料

可否養雞？

問：在養雞飼料中，可不可以以臺糖飼料依照原百分比代替豆餅，花生餅？使用臺糖飼料養雞，是否易肥？（臺南市周志宏）

答：應用臺糖飼料，依其所含蛋白質成份，可以代替大豆餅及花生餅。但因在養雞上，未見成績報告，是否易肥，未敢下斷

語。（李登元）

水牛脚不能行

應如何治療？

問：我家養一隻水牛，兩隻後脚都會「抽筋」，早晨開始走路五十步以上才恢復正常，有什麼方法治療？（臺東關山鎮楊輝）

答：牛後脚不能行走，恐怕是蹄部受傷，有鐵釘，砂石，或其他尖銳物插入。必須將該患脚提起檢查，如因上述原因而致行，治療方法請看豐年五卷第十九期。（黃立羣）

使用有毒農藥

請穿雨衣手套雨鞋

問：在報紙上常常看見農藥中毒致死的，不幸事件發生。要防備不幸事件的發生，最

好穿戴防毒衣帽，但現在備有防毒衣帽的農友實在很少，請貴社轉請有關機關大量配售防毒衣帽給農友使用。又請問本省那裡有售防毒衣帽價格多少？（臺南縣將軍鄉何平原）

答：目前我們還沒設計一種合乎本省農

鳳梨為什麼結實不齊？

蔡致談

問：我在四十四年開始栽培鳳梨，去年（第三年）結果參差不齊，請問如何使結實時期齊一？（臺東縣卑南鄉邱河煉）

答：要鳳梨結實時期整齊，必須使鳳梨植株生長發育整齊，希望鳳梨植株發育整齊，要注意下列各點。

①鳳梨園土地要平整，土壤差異小，如果是緩傾斜地，傾斜度也應均勻一致。
②鳳梨園如有陰影，蔭影處的鳳梨，生育緩慢，開花遲延。因此，鳳梨園應該設在空曠陽光充足的地方，使各株鳳梨發育整齊。

③定植時，植株必須壯大強健，吸芽苗一尺左右，裔芽苗八寸左右。不用冠芽或根芽做種苗。
④種苗在栽前必須分類，吸芽苗和裔芽苗必須分別種植；並且再根據苗的大小分級，把一樣大小的苗種在一起。

⑤秋植鳳梨必須在雨季將終了前定植完畢，使最後一、二次雨水的降落，有助於新植鳳梨抽出新根，開始生長發育。
⑥注意防治粉介殼蟲。種苗定植前，必須經過蜜粒多液浸苗手續。定植後，每隔二個月，灌蜜粒多液一次，一共灌三次，以後隨時觀察，如再發現粉介殼蟲或蟻，再灌蜜粒多液防治。

⑦耕作、施肥等管理工作必須一致。在定植後半年內，如發現鳳梨苗發育大小不齊，可趁溫度的發育期中，對小的植株多施硫酸銨，促進它們的發育，大概每兩星期一次，每株每次施五、六公分。乾燥時，改灌硫酸銨水。

已經開始結果的鳳梨園，如發育不整齊，已很難補救。第一回收穫不整齊，以後第二回第三回收穫，更參差不齊。

分類廣告

△本欄廣告限廿五行，每行六號字九個，每行收費六元。
△廣告費請利用郵政劃匯寄下。
△電話接洽請撥四七三三一。
△來稿請在出版期兩星期前寄到。

徵求

徵求克夏或雞配小
豬八或十頭又臺
農三二號甘藷若干
臺北安南區臺北縣三
重鎮金陵女中錢洽

徵求克夏或雞配小
豬八或十頭又臺
農三二號甘藷若干
臺北安南區臺北縣三
重鎮金陵女中錢洽

徵求克夏或雞配小
豬八或十頭又臺
農三二號甘藷若干
臺北安南區臺北縣三
重鎮金陵女中錢洽

讓售

田 每甲三萬荒地萬
五，由一甲四荒
地六甲八全部廉讓花
蓮吉安清水19號王洽
純種陸地鴨
世界著名產蛋鴨年產
三百枚初生雛出售照
訂購位分發雲林縣
斗南鎮東仁里新興街
三一號樂禽園劉清良

其他

各種雞種蛋二元五小
鷄五元中鷄路加桃園
塔寮坑車站前鳴瑞場
杜來連系統來杭小鷄
金巴 系統來杭小鷄
初生母雞八、五元
岡山鎮平安里五四號
譚記種雞場 黃應謙

名廠產品

蓬萊農產行

臺北永昌街二號
郵政儲金八八三七號
△日本黑葉美濃大根
△青大長胡瓜△海洋
節成胡瓜△大型卷豆
△白香菜△長種菜豆
△空心菜△白仁飯豆
△冬瓜△金瓜△刈
子△美國結球高苣
△大和二號西瓜△相
思樹子△琉球松子
※噴霧器零件齊備

優良種子

△正日本黑葉美濃
早生大根△新大和
號西瓜（青皮紅肉）
△日本金時節成胡瓜
△日本丸粒西洋波發
菜△長岡交配一號甘
藍△番茄：一代交配
種、福壽二號、交配
世界一△嫩莖高苣△
結球高苣△蜜望西瓜
△ニユメロン、露地
香瓜、美國南瓜△加
洲大甜椒、甘味大甜
椒、石刁柏。
「草菇種子」約開始

洪進興種子部

岡山新市場內郵政劃
撥第一、（四七七號）
七寸飯豆、（四季豆）
壹斤拾元，白飯豆壹
斤九元，黑飯豆壹斤
八元黑仁青莢長菜豆
壹斤捌元四角五元，普
子三五元，割割子壹
斤二十元，黑皮白刺
目瓜子千粒十二元，
大粒甜菜椒壹兩二五
元一次訂購五十元以上
包運免以示優待。