

(續上期)

## 四、愛特靈 (Aldrin)

種類 可濕性粉劑 (110%)

)，粉劑 (2·5%)，和乳劑 (22%) 等。

效用 這是對土壤害蟲特具

效力的藥劑。凡地表地中的害蟲

均可用，如①鳳梨的螞蟻，②甘

諸的象鼻蟲，③蔬菜的夜盜蟲，

④甘蔗的蔗龜、金針蟲、白蟻等。

用法與注意事項 ①防治鳳

梨園的螞蟻，用可濕性粉劑成乳

劑加水二〇〇倍噴於鳳梨園地面

。②甘蔗金針蟲、蔗龜及白蟻每

公頃用工業級愛特靈一·二五磅

至二·五磅。

## 五、地特靈 (Dieldrin)

種類 有乳劑 (1·8·5%)

，②可濕性粉劑 (50%)，③粉劑 (1·5至1·

5%) 三種。

效用 可防治①水稻的黑椿象，浮塵子類；②柑橘的天牛類；③森林的天牛類；④香蕉象鼻蟲；

⑤棉花的紅鈴蟲，赤星椿象；⑥蟻類等。

用法與注意事項 ①撒佈粉劑，對防治頑強的

黑椿象，效力很大，每公頃二五公升。②一八·五

% 地特靈乳劑加水四〇倍，塗抹於距地面三尺以下

的樹幹，可預防天牛產卵。③香蕉象鼻蟲的防治，可用五〇% 可濕性粉，加水五〇〇至八〇〇倍噴射

，或一八·五% 乳劑，加水四〇〇至六〇〇倍液。

④紅鈴蟲、赤星椿象的防治，每公頃用純地特靈一·五磅。⑤噴射五〇% 可濕性粉劑或一八·五% 乳劑加水二〇〇倍，可防治蟻類。

## 六、安特靈 (Endrin)

種類 ①乳劑 (19·5%) ②可濕性粉劑 (22%) ③粉劑 (2%) 等。

效用 可以防治的病蟲害有：①水稻的三化螟

蟲、二化螟蟲、黑尾浮塵子、黑椿象、稻椿象。②

棉花的紅鈴蟲、金剛鑽、赤星椿象、二點綠浮塵子

荔枝有下列數種重要的病蟲害：

①籬蟲 幼蟲為害最為嚴重，通常在十年生以

上的樹比較不嚴重。幼蟲在樹幹下部環食侵蝕皮層，如為害部成曲折時，樹還

可生育，不過比較衰弱，為害部份要是成一圓環，就可能枯死。發現為害時，

應用手捕殺幼蟲，並在還沒受害的樹幹上塗地特靈乳劑四〇倍液，預防侵害。

②腫葉病 荔枝春初抽新葉時，銹壁蟲寄生在新生幼葉，就形成腫脹變曲

，背面密生無數赤色毛茸，新枝被破壞無法形成花芽，或僅生少數花朵，時間

再久，可漸漸乾枯而死。可於春間一月至三月內，在朝霧未乾的清晨，每月噴

硫磺粉一次，或用石灰硫黃合劑 (水一メ〇·五度) 每月噴射二次。如發生嚴重

時，每十天噴射一次。

③介殼蟲類 荔枝樹上的介殼蟲也有多種。有壳介殼蟲大都為害枝幹或葉背面，無壳介殼蟲

在果實部位較多，尤以套袋的果實，特別利害。可在套袋前噴馬拉松乳劑一千倍一次，或在開花發芽前噴射五十倍夏油乳劑或松脂合劑二〇倍液。

④蛀蟲 蛀蟲成蟲在荔枝結實初期，產卵在果實梗旁肩部，幼蟲孵化後，就蛀入蒂部為害，幼蟲老熟後又爬出果外，在葉的背面結成白色圓形小繭而在果外蛹化。可用套袋方法預防侵蝕為害。

⑤椿象 椿象在果梗部位吸吮樹液，能使果實落果，在果實部份吸吮，能使果實部份枯乾。

。③香蕉的象鼻蟲。④其他凡 DDT 、BHC 、安特靈等可防治的蟲，或因 DDT 、BHC 不能防治的許多害蟲，安特靈都可防治。

用法與注意事項 ①普通用 一九·五% 安特靈

乳劑加水八〇〇倍噴射。②安特靈的殘留性極強，最好不用來防治蔬菜害蟲。③果樹最好不要噴射

安特靈 (尤其柑桔樹上)，以免殺死多量天敵。④

濃液絕不可觸及皮膚，以免中毒。

(未完，下期續)

# 第六卷 第一章 痘蟲藥製應用法

