

倍。八E加水一、〇〇〇至二、〇〇〇倍。

乙、馬拉松與夏油乳劑合用的，將甲項的馬拉松水溶液一〇〇公升加夏油乳劑一、五公升混合使用。

丙、防治柑橘象皮病時，將甲項水溶液八四公升加可濕性硫黃粉一公升或〇、五公升。

③馬拉松加用硫黃噴射後，至少應在一個月以上始可再噴夏油乳劑。

④普通防治用二、〇〇〇至四、〇〇〇倍

稀釋液。

十二、Chlorobenzilate

種類 ①乳劑(二五%) ②粉劑(三%)。

效用 防治各種農作物的蛛蟎類。

用法與注意事項 ①加水稀釋後噴射。②

本劑對蛛蟎的成蟲，幼蟲極有效，越冬的卵及成蟲，幼蟲需六日開始可死亡。③對天敵無毒害。④有引火性，應注意。

趕緊種植一期糊仔甘蔗！

木貝

只要十個月的生長期，每公頃可產蔗十二至十六萬公斤；這是臺中蔗作改良場種植一期糊仔甘蔗的成績。

選擇排水良好的肥沃壤土，種植臺中特六號，臺中一五〇號，或臺中六五號等直立早熟的蓬萊水稻，在插秧三日內，每五行抽拔一行，移植於兩邊株間。至三月下旬至四月上旬間，水稻第二次或第三次除草後，準備植床。植床形狀如左下圖。田面每隔八至十公尺開一橫溝，每隔三十至四十行甘蔗開一縱溝。水田週圍設深八臺寸的環溝。

蔗種應選用 HCT-1235 品種。種植前用飽和石灰水(水一千斤，谷樂生〇、一斤，石灰十五斤)浸漬二十四小時，陰乾二日後種植。蔗行南北向時蔗芽向南平植，東西向時向東平植。蔗苗不可浸水，以免腐爛。

興農的優良種子


- △興農早生甘藍：一兩十二元。
- △夏光番茄：唯一適於夏季栽培而成積優良的品種。
- △洋蔥：EG球型，EB扁型。保證純正種。
- △結球白菜：漳浦早生。
- △花椰菜：興農特選早生。
- △甜椒：加州，甘味大甜椒。
- △石刁柏：最近由美國進口。
- △甜瓜：最新高級品種。
- △雪梨甜瓜(メロン)：一兩五十元。
- △銀雪甜瓜(メロン)：一兩八十元。
- △ニユーメロン。
- △露地香瓜：ロッキン。
- △オールド，ハレスバ。
- △蜜寶西瓜△蘇魯木瓜。
- △草蓆現貨供應，一坪份二十二元。

!!購郵局郵用利多請


行子種農興

號八四段一路新重鎮重三縣北臺


號八二〇四撥劃政郵



床植的蔗甘仔糊期一



⑥二人所患同症，
，生衛無物食是(均)攪
，明說來生醫過經
。清洗手物食後此



⑤隔二日瀉人甲(又)吐，
，苦艱叫燒發痛頭
，(法辦無)度法無見看父老
。(顧招)顧來請生醫緊趕



④做衛生着研究，
，手洗先要清物食二
，想無攪食顧人
。(貳油)油油油(得吃)甲食嘴滿