



三、飼料與飼養（續上期）

礦物質通常補給鹽、鈣及磷等，其他要注意經常供給清潔的飲用水。

飼料應放在乾燥地點。選擇飼料時，應注意其喜愛性及營養價值。小麥、豆子、稻穀、花生粉等，都可用作飼料。飼料不要突然變化。

貝殼、石灰石、食鹽等礦物質補助飼料可放在木槽中，置於舍的附近，使隨時啄食。

人工飼餵粒飼時，每次餵給量，以該鴿羣在半小時內能食盡為適量。粒飼普通置於地面或廣口槽中，使隨時啄食。用廣口槽裝較為清潔。

自動飼料槽可置於鴿舍的中央或舍外一邊，附於壁上。

鴿的飼料量隨氣候、食慾及鴿大小而不同。當鴿在照顧雛鴿時，所需量較多。冷季要比熱季吃得多。普通一對鴿每年所需飼料量約在八十臺斤左右（指舍飼而言）。每七至八臺斤的飼料，可得一臺斤的小鴿（去羽後的重量）。

四、鴿舍的衛生

鴿舍要經常保持清潔與乾燥，通風要良好，舍內地面上最好鋪一寸厚的砂礫或鋸木屑，並時常更新。運動場要排水良好，比外界地面高出少許。

鴿舍每月至少清潔一次，但巢內有孵蛋或有幼

養鴿的知識

季·培·元·

鴿佔住時，不宜驚擾。鴿糞可用作園藝作物的肥料。整個鴿舍及運動場、飼料槽、飲水器，每年要大清潔二次，並要消毒。消毒水可用三%的木焦油醇（クレゾール）水溶液。巢箱及板縫中，常有蛋蟲等蟲類，尤其在天熱季節多，發現時要洒殺蟲藥。鴿身及鴿羽上有寄生蟲時，可在鴿羽上散佈氰化鈉粉，或用二十八公分氰化鈉溶於一加侖水中，使鴿水浴。

五、配種與育種

鴿幼時很難區別，雌雄至數個月大小，雄鴿開始追雌鴿作交配狀，才能清楚識別。通常雌鴿的體型，較雄鴿略小。雄鴿叫聲響亮，體型雄壯，站立時尾羽常拖曳於地。雌鴿站立時身體稍量水平。雌鴿的骨盆較緊向窄，雌鴿的較散開寬大。雌鴿在走路時，作左右搖擺狀，尾羽離地較雌鴿高。雌雄鴿在一起時，雌鴿常會追逐雌鴿，並發叫聲。

配種法有天然與人為兩種，結果都好。天然配種法，在配種季節中，雌鴿常於鴿舍內，選擇自己的配偶來配種。人為配種，在配種季節，置雌雄鴿於同一鴿舍中，供給飼料及清水，正常的約經十至十四天左右，就可配上。

配種後的雌鴿，須移飼鴿舍中，此時鴿羣應保持安靜。

鴿和其他家禽一樣，不宜過度的近親育種（如要保持某一品種的純度或優良鴿種的改良，是例外的）。普通供食用的鴿，可雜交繁殖。

六、怎樣孵化？

鴿蛋的孵化期，約為十七天。初生蛋不可留作種蛋。雌鴿如產二枚以上鴿蛋時，最好移去多餘的鴿蛋，一對種鴿，每次孵兩隻幼鴿最好。

雌鴿孵出後七至十天，如有一小鴿死亡，可另找同樣大小而情形相似的他窩小鴿，於夜間安置同一處所飼育。

小鴿長至二十五至三十天大小時，便可出售或與種鴿分開飼養。小鴿如要留作種用，可與種鴿放在一起，約經六至七週後再分開。

如遇大鴿有病或死亡，而小鴿年齡已達一星期大小時，可用人工飼餵。人工飼餵的飼料，只能用顆粒較小的粒潤，經浸潤四小時後，用手放進小鴿口中，或用注射筒飼餵，每日餵二至三次，飼量應充分，但不可過多。（完）

胃痛、胃酸過多、慢性胃炎、二日醉、胃、十二指腸潰瘍。

胃師 ACE

新農藥：富粒、把拉松以及PM乳劑等之中毒百卓效。

小野藥工業株式會社 日本 大阪
永利有限公司 台北市開封街168號

幼鴿長到七至十天大小時，如決定用作種鴿，應即分開飼育，最好能保持各項記錄，例如生長速度、增重、育成率，以及產卵情形等。