



農業信箱  
件，請在信封上  
寫「農問」二字  
，及詳細地址，  
以便本社迅速處  
理。

百美豆產量

春植為最高

問：百美豆在那一季栽培收量最多？  
（屏東縣新園鄉陳金川）

答：百美豆產量，春植最高，夏植次之，秋植又次之。（劉文慶）

改良濕地要注意排水

問：我有八分地的旱田，地下水位高，往往到了每年八月至十一月，從地下水出，影響作物生長，收穫量減少，雖設有排水溝，但地下水不斷出來。我想種水稻，但無水灌溉，所以無法插秧。每年種一次綠肥作物，以改良土質，也沒有效果，請問這種土地，如何利用為合適？適宜何類作物？（花蓮市會福三）

答：濕地的改良非常困難，施綠肥及堆肥，也不會有大效果。我勸你做好排水施設，如每區周圍排水溝要深（約一公尺）乃至中間亦應排水溝為宜。適宜作物有：芋頭、陸稻、大陵甘藷、藥菜四種作物。（余慶東）

用石油浸油桐子

發芽率會受影響

問：造林油桐，怕白蟻及野鼠食害種子，有人說：用石油浸種子後播種，就不受食害。請問這樣會不會影響發芽力？（新竹縣關西鎮羅吉湯）

答：會。（甘偉松）

四月是南部播芝麻的適期

問：芝麻在南部何時播種最適宜？適隱

士宜如何？每公頃需播種子若干？行株距多長較適宜？每公頃施用氮、磷、鉀三種肥料量各若干？施肥要點如何？每公頃產量若干？（高雄大同合作農場）

答：芝麻在南部播種適期是四月上中旬。排水良好的砂質壤土最適宜。每公頃播種子量一、二畝斗。畦寬一、五畝尺。株有三畝寸左右。散播即可，不需條播。嘉義白胡椒及嘉義黑胡椒均適砂壤土。每公頃施堆肥土糞一萬畝斤，硫酸銨二百畝斤，過磷酸石灰一百八十畝斤，氯化鉀八十公斤，都做基肥。過瘠地，可播種後三十至四十天再撒施硫酸銨及過磷酸石灰各一百畝斤每公頃一千四百畝斤至六百畝斤。（余慶東）

甘藷如有缺苗

應於一月內補植

問：我栽培甘藷，因缺水而缺苗，想要補植，但是附近的農友們說，補植的甘藷不生甘藷，請問這是真的嗎？（臺南縣官田鄉張運瑞）

答：甘藷缺苗，在一月內隨時補植，並沒有不生塊根的道理，但是補植時間距種植時過久，補植苗所生的塊根較小。但是假如補植後，雨水缺乏，補植時水份充足，塊根生長也不會差很大。（楊長濟）

大豆種子易失發芽力

問：大豆種子，用新的或是貯藏將近一年的老種，產量比較多？（屏東縣內埔鄉鍾慶豐）

答：本省氣候，夏季炎熱多濕，大豆種子儲藏期中，因為溫度高，很容易失去發芽力，所以採用新的種子，比舊的種子好。（劉文慶）

GOOD YEAR



旗牌固特異卡車胎

每年均有進步

去年實際成績如下

① 比任何其他受同樣試驗之卡車胎，初次里程多廿八%

② 他種車胎磨耗到看見帆布時，仍有原橡膠層之一半

③ 比舊式加厚車胎，初次里程多出七十六%

臺灣總代理

永惠通貿易有限公司

臺北市長安東路二號  
電話：四五三一 一九