

高牆極柑栽培談

嘉義縣梅山鄉 許學景



梅山鄉在山間，很適於栽培柑桔，我種有柑柑一百二十株，今年已經七年生，去年的收量一萬四千餘臺斤。我對極柑園的肥培管理，都聽從農業推廣人員的指導，並參照豐年報所刊載的栽培方法實施。

一、怎樣選苗 在梅山種高牆極柑較適合。苗木要選沒有病蟲害的，如有疑問，需要用四斗式波爾多液消毒較好。高牆極柑苗，葉幅寬而短（如鯛魚肚），葉尾圓的，才是好品種。

二、設法防止旱害 嘉義縣極柑結實的時候，常常遇到旱天，所以除蓋草，或是應用深根性的柚來根接外，柑園內處處掘二、三臺尺深的穴，埋入大量腐熟堆肥，埋土管或竹管，灌入少量的水，就可使柑樹容易吸收肥份，發育良好。

三、病蟲害不可怕 在柑桔休眠時期剪枝和整枝，剪下的枝葉，應集中搬到柑園外燒却，以免介殼蟲類、蚜蟲（龜神）等，被螞蟻搬往柑桔樹上，傳播蟲害。修剪枝條時，果樹上如有螞蟻巢，應立即除去。這樣整理柑園後，選擇晴天無風的日子，噴射五十倍的夏油乳劑，或是八百倍的馬拉松乳劑，就能殺死一般的害蟲，對煤病（黑煙）也很有效力。到了四、五月，溫度漸漸增高，害蟲也漸漸增多。到了五、六月間，果實結成指頭大的時候，必須噴射八百倍的馬拉松乳劑。此外，需看蟲害發生情形，時常噴射藥劑。

去年本鄉紅蜘蛛的加害最嚴重，防除法使用可濕性硫黃粉（八十至一百倍），或是石灰硫黃合劑，成本比較便宜，稀釋倍數，看氣溫情形，使用濃度「波美」〇.二至〇.五度。發生最盛時，一星期連續噴射二回。

天牛每年從四月至十月出現，時常巡視園內捕殺。瘡痂病及潰瘍病、黑星病、赤衣病等，可使用四斗式波爾多液防治。六月至十月，使用〇.二度至〇.五度的石灰硫黃合劑，就可以防治一般的病害。

四、施肥的要訣 肥料費佔柑桔生產費的大部分，所以要小心計算成本。例如每株施下十臺斤的雞糞，或是每株施下二臺斤的大豆餅，拿價格來比較，雞糞十臺斤約新臺幣六元，大豆餅二臺斤新臺幣八元，所以，如施下雞糞，每株的生產費就節省二元，三要素的成份，又勝過大豆餅。一、二年生和老弱樹，要施下較多的氮肥。中年生要施下較多的磷肥和鉀肥。果實採收後，使用尿素肥千分之五倍噴射葉面二次，可促進樹勢回復。

育雛成功的良藥

樂畜淨素

附郵二角贈送
鷄的剖驗海鷄病鑑別表

主 治：球蟲病、白喉、家禽傷寒、禽傷寒、痢疾、感冒、肺炎、疾

用法：化食時濃1%於清水中服用
療時濃2%預服



國際家畜藥物廠出品
台北具板橋鎮館前路五十二號之五