

在剪枝後，第一、二次的採摘，更要注意擴大採摘而與均勻側枝分佈的養成，絕不可早採與採摘過度。茶樹過度採摘，好比「殺雞取卵」，希望茶農們，千萬不要貪眼前的小利，吃永遠的大虧。



茶採準標友農山嶽曾導指(右)員人所試茶類平

「剪枝」、「施肥」與「採摘」，是有密切關係的三個工作，缺少一件，便不能達到增產的目的。有少數茶農，單行剪枝而不施肥，同時仍舊過度採摘，結果，茶樹比沒有剪枝的更容易衰老。使其他的茶農們，誤認剪枝會損害茶樹的生長。

又有些茶農，急着要看改進後的結果，當一、二年過去，而又看不出增產的效果時，便感覺失望，這也是不必要的。茶樹是多年生的作物，它的改良，必需經過長時間的努力，才可以看出效果的。

茶菁的價格變動是很大的。三十九年的茶菁，每斤只賣四角，而採摘一斤茶菁所需的工資是三角，茶農們可以說沒有利益。但到四十三年，每斤茶菁竟賣到三元多。今年春茶已經陸續上市了，照目前的價格，還是比栽培水稻有利，但是到秋茶採完，還有數月時間，將來的變化如何，不得而知。據老茶農的說法，春茶茶菁香味好時，那年的價錢便可望一直看好。這幾天，當你踏進製茶工廠時，便可以聞到使人欲醉的茶菁香氣，這無疑是今年茶業走運的好徵兆。

(上接第九頁「紅筋蟲」)

施藥時期及注意事項

六、七月入雨季後的一、二週，如發現池岸草叢間有草蚊時，就可開始施藥。第一次施藥以後看雨量多少及發生量，每隔四至六週再施放。至十月下旬雨季過後，池水含鹽分量又變高，比海水的含鹽量稍高時，就停止使用；全部施用三至五次。使用藥劑防治紅筋蟲，還要注意下列幾點：

①藥劑先用池水盡量稀釋，撒布應盡量使全池均勻。

②施放時間，由上午九時至十二時最好。

③施藥前，應先打開魚池通往放魚溝路的水門，由水門對側開始撒布。

〔註一〕虱目魚埤池底底面，有一層含有機質多而稍帶膠質狀的土壤。虱目魚的自然飼料「底藻」就生長在這層土壤上，所以叫做「藻床」。

〔註二〕池水中缺乏氧氣，池底發生硫化氫等有毒氣體，或者池水中繁生有毒的原生動物時，池魚會一時大量死亡，這就叫做「泛池」。

百聞不如一試

請採用「清河」各色優良種子

嘉義市中正路四八五號
清河種子行

美國改良派番茄子、長筒交配一號甘藍子、加州大粒甜蕃茄種子、清河特早生三十天黑葉包心白菜子、清河十天黑葉包心白菜子、正烏山扁圓型荳仔純白結品花椰菜子、日本ニエムロン子、特選黃皮梨仔瓜子(劉黃)、正特選四日長種馬耳早採菜頭子、新品種矮生菜豆子、正油頭龍花仁菜豆子、幼葉種紅仁白格菜豆子、正黑皮刺目瓜子、金線捲瓜子、草菇、正蘇魯種矮脚木瓜子、木瓜型金瓜子、黑仁嫩瓜子、正紅肉西瓜子、大葉虎耳耳杏菜子、全年開花菲菜子、純黃金白菜子、新品種油冬菜子、八十天油甘菜子、六十天油甘菜子、大葉格林菜子、大葉虎耳耳筒荷菜子、淨新高仔菜子、淨新懸菜子、大粒番麥子、想思樹種子、銀合歡種子、田菁子、太陽麻子、虎瓜豆子、日本各色草花種子、各種特效農藥、東和式噴霧機、等其他種子均有備、價錢低廉敬希惠賜顧指教。

克林頓引擎

輕便耐用 省油廉價



クリントン ガソリン エンジン

美國最著名·用途最廣凡
2至10匹馬力均有

甘藷發機 動力脫機 小型牽引車 動力鋸木機 動力割草機 小型耕耘機 動力噴霧機 灌溉抽水機 各種農業機械均能適用

秋津(アキツ)牌

3.5~4 HP 輕油引擎

臺灣萬興貿易行

臺北市昆明街119號

(電話：29950)