

怎樣提高養本地雞的利益

江·清·海·



臺灣本地雞的雞種，

是我們的祖先由大陸帶來的，有些雞隻，還混合洛

島紅、蘆花、名古屋，及

鬮雞的血液，所以，體型及毛色，都很複雜，產蛋能力也較其他改良品種差。但是因為本地雞生性強健，耐粗食，所以，大多數農友仍然喜歡飼養本地雞。

根據多年來的試驗，如果大家注意改良本地雞的雞種，並且改進飼養管理，農家養雞的利益，一定還可以增加不少。

一、怎樣改良雞種？

純種改良法 本地雞的生蛋力，好壞相差很多；最高的，每年產一百七十九粒，最低的，只生二十粒。

俗語說：「龍生龍鳳生鳳」，如果選擇好的雞來繁殖，必定可獲得很好的子孫，相反的，壞的種，就傳下來壞的子孫。一隻好母雞，必需具備下列五個條件。

① 生蛋早：同時孵出的一羣雌雞，最早生蛋的是好雞。我們如稍加注意，就容易知道那一隻雞是 earliest 開始生蛋的。

② 連續生蛋：有的雞生一個蛋後，需停幾天再生。有的雞連續生幾天，才停一天。連續生蛋的雞，一定是好雞。

③ 不抱窩：有的雞，生了幾個蛋就開始抱窩，而且抱的很久，才會醒過來。有些雞，生了很多蛋

才開始抱窩，而且抱窩的時間很短。還有些雞，根本不抱窩，繼續生蛋。不抱窩，或抱窩時間短的雞，是生蛋能力好的雞。

④ 換毛晚：一般的雞，是一年換一次羽毛（新雞過一年換毛），普通在秋天（九月）開始換毛，在九月以前換毛的雞，是不好的。因為換毛期中母雞不生蛋，而且，早換毛的雞，換毛期間長，所以生蛋也就少了。

⑤ 冬季也生蛋：一般的雞，在冬季不生蛋，在冬天也生蛋的雞，必定是好雞。

我們如能選到以上五個條件都齊全的雌雞，當然是最好的，但是，不能夠時，應儘量選擇具有多項上列條件的母雞做種雞。

好的公雞，就由優良母雞生出來的子代表面選擇。此外，還要注意，這樣選出來的雞是不是健康活潑。

前農復會畜牧生產組長亨德先生，用這方法在大陸改良土種雞，獲得良好的結果，本人用這方法選種，成績也很好。

雜交改良法 用本地種母雞，交配改良種公雞，所生的雜種雞，生長很快，強健，能生更多的蛋，以後逐代再和純種公雞配種，幾代後就可以和純種雞差不多了。

用這方法改良本地雞，效果顯著而確實。為求更好的成績，要作雜交用的母雞，也要嚴格選擇（方法參照

前項「純種改良法」。

雜交用的公雞，也要選擇好的，公雞品種，應視改良的目的而定，如以產肉為目的，就應選擇蘆花、紐漢西、絡島紅、名古屋等兼用種；如果以產蛋為目的，就可用來航做公雞。

二、飼養管理的改進

平衡的飼料 大多數農友養雞，都是有什麼用什麼。例如今天稻谷很多，便單用稻谷餵雞。再過些時，甘藷收穫了，便全用甘藷做飼料。這樣飼料中的成分是不平衡的，結果雞隻不能生長得好，產蛋也少了。

飼雞應該混用多種類的飼料，如碎米、玉蜀黍、麩皮、小麥、米糠、豆餅、花生餅、甘薯或樹薯



本地雞的改良者作文本

簽、骨粉、魚粉、蚶殼粉、食鹽等，適量配合成爲含有各種成分的平衡飼料，才能獲得理想的結果。

多數農友以爲餵小雞最好的飼料是米，所以，都用白米或糙米飼養小雞，其實，稻米不但價格高貴，所含成分也不及其他飼料（麩皮、玉蜀黍、小麥、大麥、碎米等），用白米養雞，不但不經濟，對雞的生長及生產，也是不利的。

驅除寄生蟲 土種雞雖然比較強健，但也會發生蛔蟲、條蟲、鞭蟲及其他腸內寄生蟲，以及雞虱等外寄生蟲。

在孵出後二個月齡時，就須開始驅蟲，以後每隔三個月再驅除腸內寄生蟲。如有雞虱發生，應隨時用DDT等藥驅除，這樣對雞隻的生長及生蛋有很大的幫助。

不要飼養太大 雞隻對飼料的利用效果，幼齡比高齡高。就是說，雞要增加一定體重量，所需要的飼料量，幼齡時較少，而高齡時增多。

本地雞要增加體重一公斤所需要的飼料（混合飼料）量如下：三十天（平均體重〇·二公斤）三·三八公斤，三十一至六十天（體重〇·五五公斤）三·五五公斤，六十一至九十天（體重一·四·三六公斤，九十一至一百二十天（體重一·五公斤）五·八七公斤，一百二十一至一百五十天（體重一·七

五公斤）十二公斤。

由這數字看來，雞隻養到越大，飼料越不經濟，所以本人以爲，本地雞養到一·五公斤（二·五臺斤）前後時（約需四個月）宰殺或販賣，最有利而合理；如再繼續飼養下去，不但浪費飼料，假如公雞養久了，反而會減輕體重。

三、防疫最要緊

本省養雞鴨，每年因傳染病而引起的損失很大。現在獸醫藥品發達，已經有辦法可防止這些傳染病。

家禽最怕的傳染病有兩種：新城雞瘟和家禽霍亂。這些傳染病的病性劇烈，一旦流行，非常厲害，有時候在數日內，一家所養的家禽全部死光，所以有「走大水」之稱。

現在防止這種傳染病並不難，只要每年打一次新城雞瘟預防疫苗，及二次家禽霍亂疫苗，就可避免。

新孵出的小雞，在兩個月後打預防針，注射費用很省，一隻只費幾毛錢，農友們可向鄉鎮公所或農會請獸醫注射。如等到傳染病發生，已經來不及防治，所以及時預防最爲要緊。

附註：一般本地雞，自孵出到開始生蛋的平均時間爲一百八十三天（最早一百三十三天，最遲二百零一天）。開始生蛋時的雌雞平均體重一·八公斤（三臺斤）。每年平均產蛋數九十八粒（最高一百七十九粒，最低二十粒）。有抱窩性，如經矯正時，平均抱窩五天（最高八天，最短三天）。大部份雌雞在冬天不生蛋。發育速度如下：初生體重三一·七公分，三十天時一九八公分，六十天時五〇公分，九十天時一公斤，一百二十天時一·五公斤，一百五十天時一·七五公斤。但是在一般農家的飼養管理環境，恐怕較差。

由這些數字看來，本地雞在產蛋方面較來航差很多（來航年生二百粒左右），發育速度比改良品種的蘆花、紐漢西、洛島紅等都差。

· 圖畫猜謎預告 ·

爲了提高讀者興趣，本刊將從六月一日起，舉辦圖畫猜謎大懸賞，第一獎可得新臺幣三千元的獎品，獎額很多，凡本刊訂戶，均有得獎機會，詳細辦法，請注意本刊八卷十一期。

應用農藥，注意中毒！

本刊八卷八期廿四頁，刊有西德拜耳廠出品的殺蟲劑廣告，那裏介紹的四種藥劑，都確實有效，將在本省大量推廣。但廣告中介绍的防治柑橘害蟲的方法，要慎重考慮。因爲柑橘是較高的樹木，藥劑向空中噴射，施用的人容易中毒，非常危險。「富粒多」與「克殺聖」都是有劇毒的藥劑，防治柑橘害蟲要避免使用，應該使用沒有毒性的「馬拉松」。

優良大葉 桃花心木苗木

造林者福音·最有利造林

便宜大賣出 訂購特別優待

苗圃地臺中縣東勢鎮新盛里十二號

張阿泉