

山地可以種植大豆嗎？

陳培基

一、山地能不能種大豆？

夏季在本省丘陵地、高冷地都可以種大豆，氣候適宜，收益也多。

此外，又因能配合山地輪作，增加有機質，改良土壤。因此，大豆是山地理想的作物，其種子豐滿，可以專作採種。

二、應採用什麼品種，何時播種？

三國種最適宜。六月下旬播種，過遲會減收。播種前須耕好耕地，減少雜草。

種子播種前須用「賜保根」粉劑拌種，藥劑用量，以薄薄塗在種子外表為度。有紫斑的種子，不宜使用。

三、有幾種耕種方法？

①定耕梯田：作畦寬一公尺（含溝），每畦條播兩行，株距二十公分，每穴播三粒，長大後留一株。

②傾斜耕地：用等高單畦方法，畦寬六十公分，株距二十公分，作一條播。播種後覆土約三公分厚。

四、需要多少肥料，怎樣施肥？

在山地，堆肥比較難得，普通每十公畝（一分地）施用堆肥六百公斤，過磷酸鈣二十五公斤，草木灰十五公斤，及石灰三十公斤，全部做基肥。為促進初期生長，在第一複葉展開時，每分地施用六

公斤硫酸銨。

五、在山地種大豆，有幾種蟲害，如何防治？

①仲芽時，易受夜盜蟲嚼斷，要噴安特靈，防治潛蠅時，多噴一點點在地上，可以驅除夜盜蟲。

②豆蚜羣集於嫩葉為害，阻碍幼株生長，撒佈安特靈、大淨濃驅殺。

③幼株易受大豆潛蠅幼蟲侵食，致嫩葉凋萎，影響生長。單葉展開後撒佈安特靈一千至一千五百倍液，或地特靈六百至八百倍液預防。安特靈對人畜有害，須注意使用。

④莖葉繁茂時，會發生蝗蟲害，應時時注意噴霧安特靈或BHC粉劑驅殺。

⑤開花、結莢期，有豆莢蛾、大豆螟蟲產卵孵化，侵食莢豆。用BHC粉或安特靈作全面撒佈。山地害蟲多，用滲透性殺蟲劑效果最大。

六、要注意那幾種病害？

①毒素病：全株萎縮不長大，由種子傳染，蚜蟲媒介。使用無病種子，驅除蚜蟲，假如有病株，應立即燒掉。

②燒葉病：多濕時期很易發生，由針頭大淡黃色斑點成爲褐色膨出病斑。撒佈四斗式波爾多液或大生防治。

③紫斑病：在豆表皮生紫色病斑，影響品質。不用有病種子，謝花後撒佈六斗式波爾多液防治。

又大豆根瘤菌爲好氣性細菌，中耕後通氣好，對根瘤菌繁殖很有效果。

播種後十五日，作第一次中耕、除草，山地雜草特多，須徹底實施。

至四十日後作第二次中耕、除草與培土。培土覆至單葉高，這樣既能保持水份，防止倒伏，並能助長結實。

八、怎樣採收，貯藏種子？

至九月中旬，葉子黃化，豆莢呈黃褐色，豆粒乾硬就可以採收。收穫期爲十月中旬，可拔取植株，五架成堆或搬至晒場晒曝，等充分乾燥後脫粒，除去雜夾物再晒乾。

貯藏

要防止濕潤，作種用種子，須十分乾燥，宜混合種子量

一的一「保粒寧」劑，密封於貯藏箱中。

七、什麼時候中耕、除草、培土？

爲促進生長，保持土中水份，中耕、除草、培土是最緊要的工作。

各種特效藥
山本ヤマトオン乳劑
山本種殺ニコチン乳劑
稻熱病に……
サンミクロン乳劑
瓜類葉萎ウダ病に……
各種病害に……
山本カラセン水和劑
藥劑の效力を増す……
パンノール展着劑
果樹!!グニ類……
ネオサンピラン乳劑

保證你產量增加
山豐大藥

永豐利株式會社
總代理
山本藥業株式會社
總代理
地址：北澤市一丁目一十八番地
電話：八二七