

農業信箱

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，及詳細地址，以便迅速處理。

利用耕種機做運輸工作 必需事先申請使用證書

問：日前，我駕駛剛從臺中永安公司買回來的耕種機，去採購甘藷。在路上，遇到了一位警察，他說我的耕種機沒有牌照，應該罰款。據我所知道的，政府已明令規定，利用小型耕種機做非營業性的運輸工作，並不需要納稅。請問我應受罰嗎？（雲林縣斗南鎮沈慶亨）

答：利用小型耕種機做非營業性的運輸工作，可不需要繳稅，但是需要申請「農用耕種機使用證」。省農會備有申請書，請寫信到「臺北市中正路一八四六號省農會」索取。拿到申請書後，請當地農會填具證明，再送回省農會轉農林廳申領使用證。（陳侯德）

椪柑為什麼有裂果？

問：椪柑在七、八、九三個月間已經噴射硫磺合劑三次，但最近果實紛紛裂開，這是什麼原因？（桃園縣大溪鎮呂阿生）

答：石灰硫磺合劑的濃度，如果是按照規定配成，不會有害椪柑果實。果實開裂原因，一般都是由於土壤中水份不能適量供應。久旱之後，遇到久雨，常會使果皮開裂。預防方法，應在乾旱時注意適量澆水，或用稻草鋪蓋樹幹周圍，或栽培矮株的其他作物，以保持土壤適量的水份。強風吹動使果實受傷，也能發生裂果，如能用竹竿支撐樹枝，以免過份振盪，也可減輕受害（洪章訓）。

長岡交配一號甘藷 不適於早期栽培

問：我想在八月（即農曆六月）播種一

長岡交配一號甘藷，但怕那時沒有這種甘藷種子。因此我想現在購買種子密封貯藏，到時不知發芽率會減成幾%。這種甘藷在九月或十月成長時，會結球嗎？（明泉）

答：種子如用乾燥劑（氯化鈣等）密封貯藏，如本來發芽率有八〇%以上，六個月後可能還有六〇%以上。

長岡交配一號甘藷是晚熟品種，過於早種成績不好，選取本地種甘藷作早期栽培較為安全。（陳文郁）

鷄隻下稀糞應如何治療？

問：鷄拉稀糞，應如何治療？（臺北市張玉林）

答：鷄隻下稀糞是因為消化不良所致。可應用消炎片（如沙發瓜尼丁）口服，每隻日服兩片，連續給與三日即可治癒。（李登元）

木炭能否治鷄病？

問：木炭內含有何種成分，可治療鷄的什麼病？（臺北市張玉林）

答：木炭的功用，只是吸收腸內因消化不良而發生的氣體，沒有其他的效用。（李登元）

如何防治香蕉黑星病？

問：香蕉葉上發生黑點，據說是黑星病，應如何防治。（南投縣中寮鄉江銘堂）

答：黑星病能為害果實，撒佈四一四式波爾多液可以防治此病。此外，撒佈大生亦有效，應用的藥液濃度為〇.三%，即每一公升清水配大生三公分，並加少許展着劑於藥液中。撒佈時期，應在新葉展開後開始，每隔一週撒佈一次。（洪章訓）

零售水蚊殺製日裝分請店貨雜村農



日本製殺蚊水 一瓶二元半

每罐十加侖份 淨重三〇〇瓦 定價二〇〇元

特價一六〇元 (每瓶本錢二元)

日本大同除蟲菊株式會社 發賣元 文化工業社

購一罐贈如圖日本明星美女十彩天然色二尺ポスター掛圖一張及四寸美術照片一張

モスキラー 燻蚊粒八〇〇粒二百元

請即成爲高角五... 將打蚊水... 份打蚊水... 美水... 奇效... 濟經... 一索... 瓶貨... 芳芬... 用實... 效... 斤四十五... 每... 元二... 每... 品業工... 隨... 使導指... 品爲舉... 表歷簡... 請者意... (則原爲%五十) 厚優益... 治函來寄

徵求地方經銷商

波爾多液與大生

那一種效果較好？

問：請問「波爾多液」與「大生」，那一種殺菌效果較好？（桃園縣大溪鎮呂阿生）

答：「波爾多液」有它的殺菌優點，但有時有輕微藥毒。「大生」沒有藥毒，不過它的藥效持久力不如「波爾多液」，所以撒佈日期的間隔要縮短，大約七天或十天噴一次。（洪章訓）

臺中六五號水稻

並無高矮兩種

問：我從四十五年上期就栽培「臺中六五號」，但成粒不大好，據說這品種有兩種，一種是高的，一種是矮的，請問那一種較好？

好？（臺中縣新社鄉謝仁森）

答：臺中六五號並沒有高矮兩種，你所說的可能是因混雜或是雜交而引起的。請向採種田交換純種（余慶東）。

大生可否與夏油乳劑

及馬拉松混合使用？

問：「大生」可以與馬拉松乳劑及夏油乳劑混合使用嗎？（桃園縣大溪鎮呂阿生）

答：可以。（洪章訓）

公牛去勢適齡

依目的而不同

問：公牛普通在滿四、五歲時開始去勢。因為工作關係，我想提早生出後一星期內去勢，可以嗎？（雲林縣大埤鄉郭唐墩）

答：公牛的去勢年齡，必須看其功用而

定。發役用的，須在成熟後（普通生後一、二年）去勢，但是品種優良的公牛，具有種用的價值，不妨多留幾年。劣牛不宜留作種用，如留用劣種牛，對整個農村的耕牛都有不利。生後一星期內去勢是過早了一點。（黃立章）

蓖麻子油粕

可否作肥料？

問：①蓖麻子油粕可否作肥料？②其肥料成分如何？③可施在何種作物？④施在鳳梨園作基肥好否？（臺東縣臺東鎮莊見）

答：①蓖麻子油粕與落花生粕同樣可作肥料，但是在土壤中和分解後始被作物吸收。普通用作基肥，在溫暖地方或在砂土中較易分解，宜與草木灰合用，促進油分分解，並中和分解時所產生的有機酸，以免為害種子

的發芽及幼植物。
②肥料成分為：氮四、九八%，磷二二、〇六%，鉀質一、九%。
③對一般作物均可當作基肥施用。
④施用在鳳梨園作基肥，最好與草木灰合用。（梁鉅榮）

如何使用谷樂生？

問：用「谷樂生」消毒西瓜、冬瓜、蘿蔔、油菜、番茄、敏豆、落花生、大豆、高粱等種子時，稀釋倍數及浸種時間各如何？（苗栗縣苑裡鎮鄭桂軒）

答：「谷樂生」不適用於處理豆類種子。至於消毒其他種子可按下列方法施行：

種子	倍數	浸種時間(分)
西瓜、冬瓜	一比一千	五
蘿蔔(大根)、油菜	一比二千	十五
番茄	一比二千	三十五

高粱用乾粉拌種，藥劑用量按種子重量計算，每一公斤種子用藥粉二公份。所有處理過的種子，除高粱外應該浸種後充分洗滌約十五分鐘，然後陰乾，再用少量「賜保根」拌種，即時播種。（洪章訓）

鴨隻孵出後三週內

不宜放入水中遊玩

問：我養有一批土著小鴨，約一週大，一週來的生長情形很好。但是最近，每在放水後發現被腳，垂翅無力而死去。週身不能發生任何分泌物，腹中空空無一物。請問是什麼原因？（臺北縣三峽鎮馮慶謙）

答：鴨在幼少時，潮濕是對其身體有害的。幼雛鴨幼毛很怕水濕，弄濕後很難得乾，尤其是在陰冷的氣候，幼雛鴨游泳後常抽筋或感冒死亡。

飼養鴨隻，孵出後三週內，不宜讓幼鴨入水。三星期後其入水還得注意氣候良好時才行。頂好是在第六個星期，鴨的背羽成毛長出後，才放入水中遊玩，比較保險，請留意。（李登元）

分類廣告

△本欄廣告限廿五行，每行六號字九個，每行收費六元。
△廣告費請利用郵政劃匯寄下。
△電話接洽請撥四七三三一。
△來稿請在出版期兩星期前寄到。

讓售

坐落花蓮佐佐木近郊面積一甲一分三厘內有晚密亞二百株李一百八十株蘇聯木瓜百餘株其他菓木數十株附有住房一棟水電俱全交通便利另有優良乳羊公羊小羊廉售請向花蓮佐倉號瑞園洽

雞糞出售

本組同仁飼養來亨雞數千隻日產雞糞數百公斤乾濕均有價格從廉凡欲長期或臨時購買者請向蘇糖虎尾總廠養雞輔導小組接洽純良桃園種小母豬六隻中壢農校葉佳植洽

營業

及小雞出售，雲林縣斗六樹北六號陳天英

其他

華興電影製片廠啟事

本公司收到豐年讀者索取何玉華小姐照片的信件共二萬餘封，已分別寄出照片一萬餘張。此種照片概用上等照相紙由本廠印晒，因紙張一時中斷，尚有六七千張照片未寄，將於本月底至下月中旬以前全部寄出，並感謝各位的關心。

董事長徐和仁謹啟

高雄市鹽埕區楊建豐金門金城鎮李建安
臺北縣泰山鄉李長明基隆市海濱路陳景秀
雲林縣斗六陳天英苗栗縣后龍翁隆吉
屏東縣新園吳中路陳仔
臺北市中山北路鄭周生
臺北縣新店廖川村李樹科
臺南市東區府前路趙添茂
彰化芬園鄭南路許榮次
許登贊許振成
許金針
屯碧峯路王榮華
彰化縣秀水黃德欽
南縣鹿耳門張清江
南縣白河陳廣田
北縣板橋鎮羅萬成
花蓮市蘇知成
雲林縣斗南田頭里蔡銀宗
臺北市維斯福路呂

豐年社啟

分類廣告 刊價便宜 歡迎刊登